

Nerica-S-19

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1997**

Date d'homologation : **3 mars 2009**

Espèce : ***Oryza sativa* x *Oryza glaberrima***

Synonyme :

Groupe variétal : **Hybride Nerica®**

Pedigree : **Tog 5681/2*IR 64/IR 31785**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **ISRA-Africa Rice**

Lieu de sélection : **Saint Louis, Sénégal**

N° de sélection : **WAS 127-12-1-2-3**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique des oreillettes de la feuille :

Port limbe paniculaire (*obs. précoce*) :

Port limbe paniculaire (*obs. tardive*) : **Erigé**

Pigmentation anthocyanique apex glumelle inférieure (*obs. précoce*) :

Pubescence de la glumelle inférieure :

Couleur du stigmate :

Cycle 50% d'épiaison* : **105 jas**

Hauteur tige (*panicule non comprise*) : **88 cm**

Pigmentation anthocyanique des nœuds :

Panicule :

- Port :
- Exsertion : **Bien saillante**
- Longueur :
- Aristation : **Présente**
- Répartition des arêtes :
- Port des ramifications :

Caractéristiques du grain

Poids de 1 000 grains : **28 gr.**

Caryopse :

- Longueur :
- Forme (*de profil*) : **Fusifforme**
- Couleur :
- Arôme : **Non parfumé**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **culture irriguée (vallée fleuve Sénégal et vallées internes au sud)**

Cycle maturité : **131 jas**

Photosensibilité :

Résistance aux maladies :

Résistance aux insectes :

Résistance à la verse : **Présente**

Résistance à la salinité :

Caractères particuliers :

Sensibilité à l'Egrenage :

Rendement potentiel en grains : **11 t/ha**

Rendement au décortilage :

Rendement à l'usinage : **63,2%**

Teneur en amylose :

Teneur en protéines :

Tenue à la cuisson : **Bonne**

* Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours après semis