

Tox 728-1

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1984**
Date d'homologation : **1997**
Espèce : ***Oryza sativa* L.**
Synonyme :
Groupe variétal : ***Indica***
Pedigree : **Mahsuri / IET 1444**
Nature génétique : **Lignée pure**
Obtenteur : **IITA**
Lieu de sélection : **Ibadan, Nigeria**
N° de sélection : **TOX 728-1**

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique des oreillettes de la feuille :
Port limbe paniculaire (*obs. précoce*) :
Port limbe paniculaire (*obs. tardive*) : **Erigé**
Pigmentation anthocyanique apex glumelle inférieure (*obs. précoce*) :
Pubescence de la glumelle inférieure :
Couleur du stigmate :
Cycle 50% d'épiaison* :
Hauteur tige (*panicule non comprise*) : **110 cm**
Pigmentation anthocyanique des nœuds :
Panicule :

- Port :
- Exsertion : **Bien saillante**
- Longueur :
- Aristation :
- Répartition des arêtes :
- Port des ramifications :

Caractéristiques du grain

Poids de 1 000 grains : **23 gr.**
Caryopse :

- Longueur :
- Forme (*de profil*) : **Très fusiforme**
- Couleur :
- Arôme :

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **culture de nappe et bas-fond (Sud Sénégal)**
Cycle maturité : **105 jas**
Photosensibilité :
Résistance aux maladies : **Pyriculariose ; Rhynchosporiose ; Helminthosporiose**
Résistance aux insectes :
Résistance à la verse :
Résistance à la salinité :
Caractères particuliers :
Sensibilité à l'Egrenage :
Rendement potentiel en grains : **4,5 – 6,5 t/ha**
Rendement au décortilage :
Rendement à l'usinage :
Teneur en amylose :
Teneur en protéines :
Tenue à la cuisson : **Bonne**

* Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours après semis