

55-437

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1955**

Date d'homologation : **1994**

Espèce : ***Arachis hypogaea* L. ssp. *fastigiata***

Groupe variétal : **Spanish**

Pedigree : **Population sud américaine, reçue de Hongrie**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **IRHO**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection : **55-437**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Érigé**

Densité de ramification : **Moyenne**

Cycle 95% maturité : **90 jas**

Couleur des folioles : **Vert clair**

Distribution générale des fleurs : **Continue**

Distribution fleurs sur la tige ppale : **Continue**

Gousse :

- Étranglement : **Faible**
- Texture en surface : **Grossière**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Absent**
- Forme du bec :

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **35 – 38 gr.**

Longueur (Taille) : **12,35 mm (Petite)**

Forme : **Ronde**

Méplat : **Léger**

Nombre de couleur du tégument mûr : **Unicolore**

Couleur du tégument unicolore : **Rose clair**

Période de dormance : **Nulle**

Pourcentage graines au décortilage : **75%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Thiès, Diourbel)**

Résistance à la sécheresse : **Présente**

Résistance à la cercosporiose : **Absente**

Résistance à l'aflatoxine : **Présente**

Rendement graines : **1,5 – 2,0 t/ha**

Rendement en fanes :

Teneur en huile : **49%**

Teneur en acide oléique : **46 – 49%**

Teneur en acide linoléique : **27 – 30%**

Quantité de semences : **60 kg/ha**

Densité pratique de semis : **160 000 pieds/ha**
(disque 24 trous x 40 cm interlignes)