

Nganda

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **2009**

Date d'homologation : **18 août 2011**

Espèce : ***Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor***

Synonyme : ***Sorghum caudatum* (Hack.) Stapf**

Race : ***caudatum***

Pedigree : **CE 151-262 x Sarvato-1**

Nature génétique : **Lignée**

Obtenteur : **ISRA**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection : **ISRA-S-622-A**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Cycle 50% plantes avec une panicle : **80 jas**

Nervure principale de la feuille paniculaire :

- Etendue de sa décoloration : **Très faible**
- Intensité coloration verte par rapport au limbe : **Même couleur**
- Coloration jaune : **Très forte**

Aristation de la glumelle : **Absente**

Pigmentation anthocyanique stigmat : **Absente**

Coloration jaune stigmat : **Absente**

Hauteur de la plante : **170 cm**

Panicule :

- Compacité : **Semi-compacte**
- Forme : **Massue**
- Exsertion : **Bien saillante**
- Couleur glumes à maturité : **Brune**

Caractéristiques du grain

Couleur du caryopse après battage : **Blanc**

Poids de 1 000 grains : **20 gr**

Tâches d'anthocyane :

Couche brune : **Absente**

Teneur en acide tannique : **Sans tannin**

Texture de l'endosperme (vitrosité) : **2**

Couleur de l'albumen vitreux :

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (zones entre 600 et 800 mm de pluie ; sol deck)**

Vigueur à la levée :

Cycle maturité : **110 jas**

Photosensibilité : **Absente**

Résistance au striga :

Résistance aux maladies foliaires :

Résistance aux moisissures des grains : **Présente**

Résistance à la verse : **Présente**

Sensibilité au *Macrophomina* :

Rendement potentiel en grains : **2 – 3 t/ha**

Teneur en protéines (N x 5,70) : **12,64%**

Taux de glucide : **71,80%**

Teneur en cellulose : **2,17%**

Teneur en phosphore (mg/100g) : **314,72**