

F2-20

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1983**

Date d'homologation : **1994**

Espèce : ***Sorghum bicolor* (L.) Moench subsp. *bicolor***

Synonyme : ***Sorghum caudatum* (Hack.) Stapf**

Race : ***caudatum***

Pedigree : **(MN1056 x 68-20) x 7410-195-1**

Nature génétique : **Lignée**

Obtenteur : **ISRA-IRAT**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection : **7820-210 (IS 87-62)**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Cycle 50% plantes avec une panicule : **85 jas**

Nervure principale de la feuille paniculaire

- Etendue de sa décoloration : **Faible**
- Intensité coloration verte par rapport au limbe : **Même couleur**
- Coloration jaune : **Absente**

Aristation de la glumelle : **Absente**

Pigmentation anthocyannique stigmat : **Absente**

Coloration jaune stigmat : **Absente**

Hauteur de la plante : **210 cm**

Panicule :

- Compacité : **Semi-compacte**
- Forme : **Presque symétrique**
- Exsertion : **Bien saillante**
- Couleur glumes à maturité : **Brun**

Caractéristiques du grain

Couleur du caryopse après battage : **Ivoire**

Poids de 1 000 grains : **22 – 28 gr**

Tâches d'anthocyane : **Absentes**

Couche brune : **Absente**

Teneur en acide tannique : **0,035% M.S**

Texture de l'endosperme (vitrosité) : **Moyenne (2,3 IPBGR)**

Couleur de l'albumen vitreux : **Blanc**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (zones entre 600 et 900 mm de pluie)**

Vigueur à la levée : **Bonne**

Cycle maturité : **110 jas**

Photosensibilité : **Faible**

Résistance au striga : **Présente**

Résistance aux maladies foliaires : **Présente**

Résistance aux moisissures des grains : **Présente**

Résistance à la verse : **Présente**

Sensibilité au *Macrophomina* :

Rendement potentiel en grains : **3 – 5,3 t/ha**

Teneur en protéines : **11,8% M.S.**

Taux de glucide :

Teneur en cellulose :

Teneur en phosphore (*mg/100g*) :