



DESCRIPTION GENERAL

Obtention : ICRISAT
Origine génétique : ICGV-SM 85045 X RG1
Groupe variétal: Virginia
N° de sélection: ICGV 96808
Dénomination ISRA : ISAR09-16

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION	CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES
➤ Caractéristiques de la plante Port à la floraison: Semi-érigé Densité de ramification: Moyenne Cycle maturité: 105 jours Couleur des folioles: Vert foncé Distribution générale des fleurs: Alterne Distribution des fleurs sur la tige ppale: Absente	Vocation culturale: Huilerie Résistance à la sécheresse: Rien à signaler Résistance aux maladies: Bonne résistance à la cercosporiose précoce et à la rosette Rendement potentiel en gousses: 2,5 t/ha Rendement potentiel en fanes: 3 t/ha Teneur en huile: 45% Teneur en acide oléique: Teneur en acide linoléique: Quantité de semences par hectare: 70 kg Densité pratique de semis: 135 000 pieds (50 x 15 cm) Disque de semis: Semoir à disque à 30 crans
➤ Caractéristiques de la gousse Étranglement: Faible Texture en surface: Moyenne Nombre de graine: 2 Proéminence du bec : Peu apparent Forme du bec: Courbé	
➤ Caractéristiques de la graine Poids de 100 graines: 59 g Longueur (Taille): 1,3 cm Forme: Sphérique Méplat: Marqué Nombre de couleur du tégument mûr: Unique Couleur du tégument unicolore: Rose clair Période de dormance: Longue (30 jours) Pourcentage graines au décorticage: 65-70%	➤ Observations: Variété est très productive et particulièrement adaptée au Sud Bassin Arachidier, Sénégal Oriental et la Basse Casamance.