

Jaboot

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1997**

Date d'homologation : **3 mars 2009**

Espèce : ***Zea mays* L.**

Synonyme :

Race :

Pedigree : **Synth 9243**

Nature génétique : **Synthétique**

Obtenteur :

Lieu de sélection : **Thaïlande**

N° de sélection :

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Cycle 50% plantes avec floraison mâle :

Pigmentation anthocyanique des racines d'ancrage :

Panicule :

- Bourrelé anthocyanique base de glume :
- Angle entre axe central et ramifications latérales :
- Courbure des ramifications : **Modérément incurvée**
- Nombre de ramifications primaires :
- Longueur axe central au dessus du rameau supérieur :

Hauteur de la plante : **200 cm**

Caractéristiques de l'épi

Pigmentation anthocyanique des soies :

Longueur :

Forme : **Cylindro-conique**

Type de grain : **Corné-denté**

Rétrécissement de la partie supérieure du grain : **Faible**

Couleur du sommet du grain : **Blanc**

Couleur de la face dorsale du grain : **Blanc**

Intensité de la couleur jaune :

Pigmentation anthocyanique des glumes de la rafle : **Nulle**

Poids de 100 grains :

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Kaolack, Fatick, Sénégal oriental, Casamance)**

Cycle maturité : **90 – 95 jas**

Recouvrement des spathes : **Bon**

Résistance à la rouille :

Résistance à l'helminthosporiose : **Présente**

Résistance à la verse : **Présente**

Résistance à la cassure de la tige : **Présente**

Rendement potentiel en grains : **3 – 4 t/ha**

Teneur en protéines :