

NERICA-1

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1994**

Date d'homologation : **3 mars 2009**

Espèce : ***Oryza sativa* x *Oryza glaberrima***

Synonyme :

Groupe variétal : **Hybride Nerica®**

Pedigree : **WAB 56-104 / CG 14**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **ISRA-Africa Rice**

Lieu de sélection : **Bouaké, Côte d'Ivoire**

N° de sélection : **WAB 450-I-B-P-38-HB**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Pigmentation anthocyanique des oreillettes de la feuille :

Port limbe paniculaire (*obs. précoce*) :

Port limbe paniculaire (*obs. tardive*) : **Erigé**

Pigmentation anthocyanique apex glumelle inférieure (*obs. précoce*) :

Pubescence de la glumelle inférieure :

Couleur du stigmate :

Cycle 50% d'épiaison* : **70 – 75 jas**

Hauteur tige (*panicule non comprise*) : **100 cm**

Pigmentation anthocyanique des nœuds :

Panicule :

- Port :
- Exsertion : **Bien saillante**
- Longueur :
- Aristation : **Absente**
- Répartition des arêtes :
- Port des ramifications :

Caractéristiques du grain

Poids de 1 000 grains : **29 gr.**

Caryopse :

- Longueur :
- Forme (*de profil*) : **Fusifforme**
- Couleur : **Blanche**
- Arôme : **Parfumé**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **culture pluviale (Centre et sud Sénégal)**

Cycle maturité : **95 – 100 jas**

Photosensibilité :

Résistance aux maladies : **Pyriculariose**

Résistance aux insectes :

Résistance à la verse : **Présente**

Résistance à la salinité :

Caractères particuliers :

Sensibilité à l'Egrenage :

Rendement potentiel en grains : **4,5 t/ha**

Rendement au décortilage :

Rendement à l'usinage : **63%**

Teneur en amylose : **26,6%**

Teneur en protéines :

Tenue à la cuisson : **Bonne**

* Hiv= en hivernage ; CSC= en contre-saison chaude ; Jas= jours après semis