

57-422

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1957**

Date d'homologation :

Espèce : ***Arachis hypogaea* L. Ssp. *hypogaea***

Groupe variétal : **Virginia**

Pedigree : **Population C 334-3-404 de Tifton, USA**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **IRHO**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection : **57-422**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Erigé**

Densité de ramification : **Forte**

Cycle maturité : **105 – 110 jas**

Couleur des folioles : **Vert clair**

Distribution générale des fleurs :

Distribution des fleurs sur la tige ppale :

Gousse :

- Étrangement : **Très fort**
- Texture en surface : **Absente**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Apparent**
- Forme du bec : **Recourbée**

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **65 – 69 gr.**

Longueur (Taille) : **16,76 mm (Grosse)**

Forme : **Cylindrique**

Méplat : **Léger**

Nombre de couleur du tégument mûr : **Multicolores**

Couleur du tégument unicolore : **Rose jaunâtre**

Période de dormance : **4 semaines**

Pourcentage graines au décortilage : **78%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Nioro, Casamance, Sénégal oriental)**

Résistance à la sécheresse : **Absente**

Résistance à la cercosporiose : **Absente**

Résistance à l'aflatoxine : **Absente**

Rendement graines : **2,5 t/ha**

Rendement en fanes :

Teneur en huile : **50% de la graine sèche**

Teneur en acide oléique : **50 – 53%**

Teneur en acide linoléique : **27 – 30%**

Quantité de semences : **70 kg/ha**

Densité pratique de semis : **100 000 pieds/ha
(disque 20 crans x 50 cm)**