

69-101

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1969**

Date d'homologation :

Espèce : ***Arachis hypogaea* L. Ssp. *hypogaea***

Groupe variétal : **Virginia**

Pedigree : **55-455 X 28-206 /// 28-206**

Nature génétique : **Lignée pure**

Obtenteur : **IRHO**

Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**

N° de sélection : **69-101**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Erigé**

Densité de ramification : **Forte**

Cycle maturité : **125 jrs**

Couleur des folioles : **Vert foncé**

Distribution générale des fleurs :

Distribution des fleurs sur la tige ppale : **Alterne**

Gousse :

- Étrangement : **Très faible**
- Texture en surface : **Fine**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Absent**
- Forme du bec :

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **46 – 50 gr.**

Longueur (Taille) : **12,74 mm (Petite)**

Forme : **Arrondie**

Méplat : **Marqué**

Nombre de couleur du tégument mûr : **Unicolore**

Couleur du tégument unicolore : **Rose**

Période de dormance : Totale et prolongée

Pourcentage graines au décortilage : **73%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Casamance, Sénégal oriental)**

Résistance à la sécheresse : **Absente**

Résistance à la cercosporiose : **Présente**

Résistance à la rosette : **Présente**

Résistance à l'aflatoxine :

Rendement graines : **1,5 – 2,5 t/ha**

Rendement en fanes :

Teneur en huile : **50% de la graine sèche**

Teneur en acide oléique : **65 – 68%**

Teneur en acide linoléique : **14 – 17%**

Quantité de semences : **55 kg/ha**

Densité pratique de semis : **99 500 pieds/ha**
(disque 24 trous x 60 cm)