

73-33

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1973**
Date d'homologation :
Espèce : ***Arachis hypogaea* L. Ssp. *hypogaea***
Groupe variétal : **Virginia**
Pedigree : **58-560 x 59-49**
Nature génétique : **Lignée pure**
Obtenteur : **IRHO-ISRA**
Lieu de sélection : **Nioro, Sénégal**
N° de sélection :



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Erigé**
Densité de ramification : **Moyenne**
Cycle 95% maturité : **105 – 110 jas**
Couleur des folioles : **Vert foncé**
Distribution générale des fleurs :
Distribution des fleurs sur la tige ppale : **Alterne**
Gousse :

- Étrangement : **Fort**
- Texture en surface : **Grossière**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Moyen^t apparent**
- Forme du bec :

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **48 – 52 gr.**
Longueur (Taille) : **14,62 mm**
Forme : **Cylindrique**
Méplat : **Nul**
Nombre de couleur du tégument mûr : **Unicolore**
Couleur du tégument unicolore : **Rose**
Période de dormance : **5% germination immédiate**
Pourcentage graines au décortilage : **73%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Sud Thiès, Kaolack, Fatick, Sénégal oriental)**
Résistance à la sécheresse : **Présente**
Résistance à la cercosporiose : **Absente**
Résistance à l'aflatoxine : **Présente**
Rendement graines : **2 – 2,5 t/ha**
Rendement en fanes :
Teneur en huile : **50%**
Teneur en acide oléique : **58 – 61 %**
Teneur en acide linoléique : **20 – 22 %**

Quantité de semences : **70 kg/ha**
Densité pratique de semis : **153 000 pieds/ha**
(disque 30 crans x 50 cm)