

55-33

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1991**
Date d'homologation : **17 février 2010**
Espèce : ***Arachis hypogaea* L. ssp. *fastigiata***
Groupe variétal : **Spanish**
Pedigree : **[55-437 x Chico] /// 55-437 (BC4)**
Nature génétique : **Lignée pure**
Obtenteur : **ISRA-CIRAD**
Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**
N° de sélection : **33**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Érigé**
Densité de ramification : **Moyenne**
Cycle 95% maturité : **80 jas**
Couleur des folioles : **Vert**
Distribution générale des fleurs : **Complexe**
Distribution des fleurs sur la tige ppale : **Continue**
Gousse :

- Étrangement : **Très peu marqué**
- Texture en surface : **Grossière**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Très peu apparent**
- Forme du bec :

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **38 – 40 gr.**
Longueur (Taille) : **11,17 mm (Petite)**
Forme : **Ronde**
Méplat : **Marqué**
Nombre de couleur du tégument mûr : **Unicolore**
Couleur du tégument unicolore : **Rose**
Période de dormance : **Nulle**
Pourcentage graines au décortilage : **70%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Louga, Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack)**
Résistance à la sécheresse : **Présente**
Résistance à la cercosporiose : **Absente**
Résistance à l'aflatoxine :
Rendement graines : **2,0 t/ha**
Rendement en fanes :
Teneur en huile : **52%**
Teneur en acide oléique :
Teneur en acide linoléique :

Quantité de semences : **65 kg/ha**
Densité pratique de semis : **160 000 pieds/ha**
(disque 24 crans x 40 cm)

N.B : Variété protégée par un Certificat d'obtention