

H 75-0

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1994**
Date d'homologation : **17 février 2010**
Espèce : ***Arachis hypogaea* L. Ssp. *hypogaea***
Groupe variétal : **Virginia**
Pedigree : **GH 119-20 x 57-422**
Nature génétique : **Lignée pure**
Obtenteur : **ISRA**
Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**
N° de sélection : **H 75-0**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Erigé**
Densité de ramification : **Moyenne**
Cycle maturité : **120 jas**
Couleur des folioles : **Vert foncé**
Distribution générale des fleurs :
Distribution des fleurs sur la tige ppale : **Alterne**
Gousse :

- Étrangement : **Fort**
- Texture en surface : **Grossière**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Peu apparent**
- Forme du bec : **Recourbée**

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **65 – 70 gr.**
Longueur (Taille) : **16,48 mm**
Forme : **Cylindrique**
Méplat :
Nombre de couleur du tégument mûr : **Unicolore**
Couleur du tégument unicolore : **Rose**
Période de dormance : **Longue**
Pourcentage graines au décortilage : **60%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Cultures irriguée ; pluviale
(Fleuve Sénégal, Casamance, Sénégal Oriental)**
Résistance à la sécheresse : **Absente**
Résistance à la cercosporiose : **Présente**
Résistance à l'aflatoxine :
Rendement graines : **Irrig 4 t/ha ; Hiv 2 t/ha**
Rendement en fanes :
Teneur en huile : **(Arachide de bouche)**
Teneur en acide oléique :
Teneur en acide linoléique :

Quantité de semences : **70 – 90 kg/ha**
Densité pratique de semis : **130 000 pieds/ha
(disque 20 crans x 50 cm)**