

PC 79-79

DESCRIPTION GENERALE

Date d'obtention : **1994**
Date d'homologation : **17 février 2010**
Espèce : ***Arachis hypogaea* L. Ssp. *hypogaea***
Groupe variétal : **Virginia**
Pedigree : **53-68 x 59-127**
Nature génétique : **Lignée pure**
Obtenteur : **ISRA**
Lieu de sélection : **Bambey, Sénégal**
N° de sélection : **79-79**



CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Caractéristiques de la plante

Port à la floraison : **Erigé**
Densité de ramification : **Forte**
Cycle maturité : **120 jas**
Couleur des folioles : **Vert foncé**
Distribution générale des fleurs : **Alterne**
Distribution des fleurs sur la tige ppale : **Sans inflorescence**
Gousse :

- Étrangement : **Faible**
- Texture en surface : **Fine**
- Nombre de graines : **Deux**
- Proéminence du bec : **Peu apparent**
- Forme du bec : **Recourbée**

Caractéristiques de la graine

Poids de 100 graines : **40 – 45 gr.**
Longueur (Taille) : **15,01 mm**
Forme : **Oblongue**
Méplat : **Assez marqué**
Nombre de couleur du tégument mûr : **Unicolore**
Couleur du tégument unicolore : **Rose**
Période de dormance : **Très bonne (Longue)**
Pourcentage graines au décortilage : **74%**

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES et TECHNOLOGIQUES

Vocation culturale : **Culture pluviale (Sud Tambacounda et Bakel)**
Résistance à la sécheresse : **Absente**
Résistance à la cercosporiose : **Présente**
Résistance à l'aflatoxine :
Rendement graines : **2,5 t/ha**
Rendement en fanes :
Teneur en huile : **48%**
Teneur en acide oléique :
Teneur en acide linoléique :

Quantité de semences : **60 – 70 kg/ha**
Densité pratique de semis : **100 000 pieds/ha**