

Danh mục: Chế Độ Ăn Kiêng

Chế Độ Ăn Cho Người Tiểu Đường Type 2

Chế Độ Ăn Cho Người Tiểu Đường Type 2

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Không có chế độ ăn "một size cho tất cả" với tiểu đường. Mục tiêu chính là kiểm soát lượng carbohydrate (tinh bột, đường) để tránh đường huyết tăng đột ngột sau ăn.

CHỈ SỐ GLYCEMIC INDEX (GI)

GI đo tốc độ thức ăn làm tăng đường huyết:

- GI thấp (< 55): tốt cho người tiểu đường
- GI trung bình (55–70): ăn vừa phải
- GI cao (> 70): hạn chế tối đa

THỰC PHẨM NÊN ĂN

Rau xanh không tinh bột: rau muống, cải xanh, bông cải, dưa leo, cà chua

Protein nạc: ức gà, cá (đặc biệt cá béo như cá hồi, cá thu), đậu hũ, trứng

Ngũ cốc nguyên hạt: gạo lứt, yến mạch, bánh mì nguyên cám

Chất béo lành mạnh: dầu ô liu, bơ (avocado), hạt óc chó, hạnh nhân

Trái cây GI thấp: táo, lê, cam, bưởi, dâu tây

THỰC PHẨM CẦN HẠN CHẾ

Cơm trắng, bánh mì trắng, bún, phở, mì (GI cao)

Đồ ngọt: bánh kẹo, nước ngọt, chè, kem

Thức ăn chiên xào nhiều dầu mỡ

Thịt mỡ, thịt chế biến sẵn (xúc xích, thịt nguội)

Rượu bia: làm hạ đường huyết đột ngột, nguy hiểm

VÍ DỤ MỘT NGÀY ĂN LÀNH MẠNH

Bữa sáng: Cháo yến mạch + 1 quả trứng luộc + rau xanh

Bữa trưa: Cơm gạo lứt (1/2 chén nhỏ) + cá kho + canh rau

Bữa tối: Bún (nhỏ) hoặc khoai lang + thịt gà + rau xào

Bữa phụ: Một nắm hạt (hạnh nhân, óc chó) hoặc 1 quả táo

VỀ PHỞ VÀ BÚN

Phở và bún có GI cao (60–70), làm đường huyết tăng nhanh. Nếu ăn:

- Chọn phần nhỏ (nửa tô bình thường)
- Tăng rau giá, rau thơm
- Giảm nước dùng (nhiều muối và đường)
- Ăn protein (thịt, trứng) trước để làm chậm hấp thu đường
- Đo đường huyết sau ăn 1-2 giờ để xem phản ứng cơ thể

PHÂN CHIA BỮA ĂN

Nên ăn 3 bữa chính + 1-2 bữa phụ nhỏ.

Danh mục: Chế Độ Ăn Kiêng

Không bỏ bữa: dễ gây hạ đường huyết (nếu đang dùng thuốc).

Ăn đúng giờ giúp ổn định đường huyết.