

Bệnh Tiểu Đường Type 2 - Tổng Quan

Bệnh Tiểu Đường Type 2 - Tổng Quan

Bệnh tiểu đường type 2 (đái tháo đường type 2) là tình trạng cơ thể không sử dụng insulin hiệu quả, dẫn đến lượng đường trong máu cao hơn mức bình thường.

NGUYÊN NHÂN

Tiểu đường type 2 xảy ra khi tế bào của cơ thể kháng insulin (kháng insulin), hoặc tuyến tụy không sản xuất đủ insulin. Insulin là hormone giúp đường (glucose) từ máu đi vào tế bào để cung cấp năng lượng.

YẾU TỐ NGUY CƠ

- Thừa cân, béo phì (đặc biệt mỡ bụng)
- Ít vận động thể lực
- Tiền sử gia đình có người bị tiểu đường
- Tuổi trên 45
- Tiền đái tháo đường (đường huyết cao hơn bình thường nhưng chưa đến mức tiểu đường)
- Huyết áp cao, mỡ máu cao

TRIỆU CHỨNG

- Khát nước nhiều, tiểu nhiều
- Mệt mỏi, thiếu năng lượng
- Nhìn mờ
- Vết thương lâu lành
- Tê bì chân tay
- Nhiễm trùng tái phát (nấm, đường tiết niệu)

Lưu ý: Nhiều người tiểu đường type 2 không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu.

CHỈ SỐ ĐƯỜNG HUYẾT CHẨN ĐOÁN

- Bình thường khi đói: < 100 mg/dL (5.6 mmol/L)
- Tiền đái tháo đường: 100–125 mg/dL
- Tiểu đường: ≥ 126 mg/dL (đo 2 lần riêng biệt)
- HbA1c (phản ánh đường huyết 3 tháng): $\geq 6.5\%$ là tiểu đường

BIẾN CHỨNG NẾU KHÔNG KIỂM SOÁT

- Tim mạch: nhồi máu cơ tim, đột quỵ
- Thận: suy thận mãn tính
- Mắt: mù lòa do bệnh võng mạc tiểu đường
- Thần kinh: tê liệt, đau thần kinh ngoại biên
- Bàn chân: loét, hoại tử có thể phải cắt cụt

KIỂM SOÁT BỆNH

Tiểu đường type 2 có thể được kiểm soát tốt bằng:

- Thay đổi lối sống (chế độ ăn + tập thể dục)

Danh mục: Tiểu Đường Type 2

2. Thuốc uống (Metformin là lựa chọn đầu tay)
3. Insulin (khi cần thiết)
4. Theo dõi đường huyết định kỳ