## Standing order for re-challenge anti-TB drugs for Maculopapular rash

## Namyuen hospital

		-Admit ห้องแยก		-Stop Anti TB Drugs ให้ Anti-Histamine และ Prednisolone
เริ่มปรับยาทีละตัว ถ้า INH ไม่แพ้ เพิ่ม Rifampicin		D1INH(100) 1.5 t o hs. D2INH(100) 1.5 t o hs. D3INH(100) 1.5 ts o hs. D4INH(100) 1.5 ts o hs. D5INH(100) 3 ts o hs. D6INH(100) 3 ts o hs. D7INH(100) 3 ts o hs.		ขนาดต่ำ จนกว่าผื่นจะ หาย
HN AN	J	Name	AGE	Ward

อ้างอิง : แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย 2018 หน้า 16-17

## Standing order for re-challenge anti-TB drugs for Maculopapular rash

## Namyuen hospital

Progress Note	Date/time	Order for one day	Date/time	Continuous order		
		D8Rifam (300) 0.5 ts o hs.		INH(100)		
		D9Rifam (300) 0.5 ts o hs.		3 ts o hs		
		D10Rifam (300) 0.5 ts o hs.				
		D11Rifam (300)1 ts o hs.				
		D12Rifam (300) 1 ts o hs.				
		D13Rifam (300) 1 ts o hs.				
		D14Rifam (300) 1 ts o hs.		INH(100)		
				3 ts o hs+		
ถ้าไม่แพ้				Rifam 300		
Rifampicin						
เติม Ethambutol						
ระหว่างปรับยาหาก		D15 Etham 0.5 t o hs.				
มีผื่นขึ้นระหว่างกิน		D16 Etham 0.5 t o hs.				
ยาตัวใดก็ตามให้		D17 Etham 0.5 t o hs.				
หยุดยาตัวนั้นทันที		D18 Etham 1.5 t o hs.				
		D19 Etham 1.5 t o hs.				
*ถ้าแพ้ I 2RZE/10RE		D20 Etham 1.5 t o hs.				
ถ้าแพ้ R 2SIE/16IE		D21 Etham 1.5 t o hs.				
ถ้าแพ้ Z 2IRE/7IR ถ้าแพ้ E 2IRZ/6IR*						
FILLW E ZIKZ/OIK"		PZA ปรับตัวสุดท้าย				
HN	AN	Name	AGE	Ward		
Attending physician						

อ้างอิง : แนวทางการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย 2018 หน้า 16-17