
A Programme breadth: which ORFs are transcribed at all
Productive controls (n = 44)
EV (n = 10)
Peri−lesional (n = 15)
Neoplasia (n = 26)
Unselected skin (n = 217)
Cell line (n = 98)
Engineered (n = 18)
90 94 86 90 90 90
86 95 86 86 95 86
97 97 97 97 97 97
57 65 50 69 50 54
22 23 10 14 19 21
53 34 90 93 36 11
66 18 71 76 39 13
E1 E2 E6 E7 L1 L2
% of libraries with >=1 read
100
75
50
25
0
B Programme composition: where the viral reads fall (libraries with >= 20 viral reads)
Productive controls (n = 40)
EV (n = 9)
Peri−lesional (n = 15)
Neoplasia (n = 18)
Unselected skin (n = 36)
Cell line (n = 87)
Engineered (n = 12)
0% 25% 50% 75% 100%
Mean share of a library's viral reads
L2
L1
E7
E6
E2
E1
C The criterion: early−region against L1 capsid transcription, per library
L1 major−capsid reads + 1
1e+05
1e+03
1e+01
productive threshold (L1 >= 3)
1e+01 1e+03 1e+05
Early−region reads + 1
Productive controls
EV
Peri−lesional
Neoplasia
Unselected skin
Cell line
Engineered