

Le temps comme rapport énergie dissipée / rigidité du vide

Réflexion personnelle, implications, analyse dimensionnelle, dérivation gravitationnelle et calcul de Planck

1. Hypothèse de départ

Le temps local n'est pas une coordonnée fondamentale mais le rapport entre une énergie localement dissipée et la rigidité du vide :

$$t = E_{\text{diss}} / R$$

Cette idée s'apparente à la gravité émergente (Jacobson, Verlinde) et à la thermodynamique de l'espace-temps (Rovelli : temps thermique). Elle n'est pas un modèle établi : c'est un cadre de travail à tester.

2. Cinq implications qualitatives

(a) Temps relationnel. Sans dissipation (équilibre parfait, $E_{\text{diss}} = 0$), $t = 0$: le temps n'a plus de sens local. Le temps est le rythme auquel l'énergie « s'écoule » dans le vide.

(b) Flèche du temps. La dissipation étant irréversible, le temps l'est aussi ; le lien avec l'entropie est structurel et non ajouté.

(c) Relativité. Une forte concentration d'énergie modifie R localement ; si R augmente, t diminue (voir §5 pour la forme exacte).

(d) Cosmologie. Si la rigidité effective du vide évoluait avec l'expansion (énergie noire), le rythme du temps cosmique évoluerait aussi. Hypothèse spéculative, aucun calcul ici.

(e) Gravité émergente. Espace, gravité et temps seraient des grandeurs macroscopiques (comme la température), sans sens sous la longueur de Planck.

3. Analyse dimensionnelle

Avec t en secondes et E en joules, la rigidité doit avoir la dimension d'une puissance :

$$[R] = [E]/[t] = \text{J/s} = \text{W} = \text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3}$$

Le vide n'est donc pas un ressort, mais une **capacité limite de transfert d'énergie** (une impédance énergétique). Lien avec la relativité générale : l'équation d'Einstein $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$, avec $\kappa = 8\pi G/c^4$, relie courbure et énergie. L'inverse $1/\kappa$ est la « rigidité » de l'espace-temps :

$$\begin{aligned} [1/\kappa] &= c^4/(8\pi G) = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} = \text{N} \text{ (une force)} \\ c/\kappa &= c^5/(8\pi G) \rightarrow \text{N} \cdot \text{m/s} = \text{W} \text{ (une puissance)} \end{aligned}$$

La rigidité en watts s'obtient donc naturellement en multipliant la rigidité d'Einstein par c :

$$R_0 = c^5/(8\pi G)$$

4. Calcul numérique : le lien avec Planck

Grandeur	Expression	Valeur
----------	------------	--------

Puissance de Planck	c^5/G	$3,63 \times 10^{52} \text{ W}$
Force de Planck	c^4/G	$1,21 \times 10^{44} \text{ N}$
Énergie de Planck	$\sqrt{(\hbar c^5/G)}$	$1,96 \times 10^9 \text{ J}$
Temps de Planck	$\sqrt{(\hbar G/c^5)}$	$5,39 \times 10^{-44} \text{ s}$
Rigidité d'Einstein $1/\kappa$	$c^4/(8\pi G)$	$4,8 \times 10^{42} \text{ N}$
Rigidité du vide R_0	$c^5/(8\pi G)$	$1,44 \times 10^{51} \text{ W}$

Avec $E = E_P$ et $R = c^5/G$, on obtient $t = E_P/P_P = t_P$: **c'est une tautologie**, puisque P_P est définie comme E_P/t_P . Cela n'est pas une confirmation du modèle.

L'interprétation utile est la suivante :

$$t_{\min} = E/R_0 ; \text{ pour } E = E_P : t = 8\pi \cdot t_P \approx 1,36 \times 10^{-42} \text{ s}$$

Le temps de Planck apparaît ainsi comme le plus petit temps que l'équation produit lorsque la rigidité est plafonnée à la valeur d'Einstein. Pour l'énergie d'une collision du LHC ($\sim 10^{-6} \text{ J}$), $t \approx 7 \times 10^{-58} \text{ s}$: très inférieur à tout ce qui est mesurable.

5. Dérivation de la rigidité gravitationnelle $R(r)$

Étape 1 — métrique. Pour un corps de masse M (Schwarzschild), avec $r_s = 2GM/c^2$ et $f(r) = 1 - r_s/r$, une horloge statique au rayon r a un temps propre :

$$d\tau = \sqrt{f(r)} \cdot dt_\infty$$

Étape 2 — référence. Pour un observateur à l'infini, l'énergie E se dissipe dans un vide de rigidité R_0 en un temps de référence :

$$\Delta t_\infty = E / R_0$$

Étape 3 — exigence. On veut que le temps écoulé au rayon r , pour la même énergie, se lise $t(r) = E / R(r)$ et reproduise la relativité générale, $t(r) = \sqrt{f} \cdot \Delta t_\infty$. D'où :

$$\begin{aligned} E / R(r) &= \sqrt{f(r)} \cdot E / R_0 \\ \square R(r) &= R_0 / \sqrt{(1 - r_s/r)} \end{aligned}$$

Étape 4 — limites. Loin de la masse ($r \rightarrow \infty$) : $R \rightarrow R_0$, $t = E/R_0$ (valeur maximale, vide « détendu »). À l'horizon ($r \rightarrow r_s$) : $R \rightarrow \infty$, $t \rightarrow 0$, le temps s'arrête. Au premier ordre en r_s/r : $R \approx R_0 (1 + GM/(rc^2)) = R_0 (1 - \Phi/c^2)$, avec $\Phi = -GM/r$: la rigidité croît avec la profondeur du potentiel gravitationnel.

Limites de cette dérivation

Ce n'est pas une prédiction. L'étape 3 impose le résultat : $R(r)$ est choisie pour coïncider avec la dilatation gravitationnelle de la relativité générale. On obtient une **reformulation** cohérente, pas une explication nouvelle.

Subtilité de l'équivalence. Localement, le principe d'équivalence impose que la physique soit celle de l'espace plat : un observateur au repos près de l'horizon mesure la même rigidité R_0 . Le facteur $1/\sqrt{f}$ n'a de sens que pour la comparaison avec l'observateur à l'infini. En termes de puissances : l'énergie est décalée vers le rouge d'un facteur $\sqrt{f}$ et les durées dilatées d'un facteur $1/\sqrt{f}$, de sorte que la puissance vue de l'infini est $P_\infty = f \cdot P_{\text{loc}}$; vue ainsi, la rigidité effective tend vers 0 à l'horizon et c'est la durée vue de l'infini qui diverge. Le sens physique de « $R \rightarrow \infty$ » dépend donc de qui mesure : il faut le fixer avant toute

prédiction.

6. Dérivation de Jacobson : d'où vient $R_0 = c^5/(8\pi G)$

Jacobson (1995) obtient l'équation d'Einstein à partir de la thermodynamique. Hypothèses : (i) au voisinage de tout point existe un horizon de Rindler local, (ii) l'entropie est proportionnelle à l'aire de l'horizon, $S = \eta \cdot A$ (en unités $k_B = 1$), (iii) la relation de Clausius $\delta Q = T dS$ tient pour tout flux de chaleur à travers cet horizon.

Étape 1 — température. Un observateur d'accélération a propre voit l'horizon à la température d'Unruh :

$$T = \hbar a / (2\pi c k_B)$$

Étape 2 — chaleur. Le flux d'énergie à travers l'horizon est mesuré par le vecteur de Killing de « boost » $\chi^a = -\kappa_b \lambda k^a$, où k^a est le vecteur nul tangent aux générateurs, λ le paramètre affine et $\kappa_b = a/c$:

$$\delta Q = \int T_{ab} \chi^a d\Sigma^b = -\kappa_b \int \lambda T_{ab} k^a k^b d\lambda dA$$

Étape 3 — variation d'aire. L'équation de Raychaudhuri, au premier ordre, donne l'expansion $\theta = -\lambda R_{ab} k^a k^b$ des générateurs, d'où :

$$\delta A = \int \theta d\lambda dA = -\int \lambda R_{ab} k^a k^b d\lambda dA$$

Étape 4 — Clausius. En posant $\delta Q = T \cdot \eta \cdot \delta A$ et en simplifiant le facteur commun $\int \lambda (...) d\lambda dA$, valable pour tout k^a nul :

$$R_{ab} k^a k^b = \kappa_E \cdot T_{ab} k^a k^b \text{ avec } \kappa_E = 2\pi / (\hbar \eta c)$$

Étape 5 — constante. Avec la valeur de Bekenstein-Hawking $\eta = c^3/(4G\hbar) = 1/(4 l_P^2)$, on trouve $\kappa_E = 8\pi G/c^4$, c'est-à-dire l'équation d'Einstein (la constante cosmologique apparaît comme constante d'intégration). Le facteur de proportionnalité entre courbure et énergie est ainsi fixé par η :

$$1/\kappa_E = \hbar \eta c / (2\pi) = c^4/(8\pi G)$$

Étape 6 — rigidité du vide. En multipliant par c pour obtenir une puissance (§3) :

$$R_0 = c/\kappa_E = \hbar c^2 \eta / (2\pi) = \hbar c^2 / (8\pi l_P^2) = c^5/(8\pi G)$$

Lecture : R_0 est le quantum d'action $\hbar/2\pi$ fois c^2 fois la densité d'entropie par unité d'aire de l'horizon. Plus le vide stocke d'entropie par unité d'aire (η grand), plus il est « rigide » ; avec $\eta = 1/(4 l_P^2)$, on retrouve la valeur calculée au §4.

Ce que la dérivation établit. Elle justifie la forme et le facteur 8π de R_0 , et relie la « rigidité » à l'entropie de l'horizon, ce qui soutient le choix thermodynamique du modèle.

Ce qu'elle n'établit pas. (1) $\eta = 1/(4 l_P^2)$ est une entrée : Jacobson montre que G est équivalent à η , il ne le calcule pas. (2) La dérivation donne les équations d'Einstein, pas la relation $t = E/R_0$: cette dernière reste un postulat du modèle (la dimension de R_0 est fixée, pas son rôle de « dénominateur du temps »). (3) L'hypothèse de l'équilibre local est discutée dans la littérature (Jacobson lui-même ajoute des termes d'entropie d'intrication/non-équilibre pour $f(R)$).

7. Extension bimétrique : compatibilité avec le modèle Janus (spéculatif)

Le modèle Janus (J.-P. Petit) décrit deux métriques g et $\bar{g}$ sur la même variété, couplées par (arXiv 2412.04644, éq. 92-93) :

$$\begin{aligned} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} R &= \chi \left[T_{\mu\nu} + \sqrt{(|\bar{g}|/|g|)} T^-_{\mu\nu} \right] \\ R^-_{\mu\nu} - \frac{1}{2} \bar{g}_{\mu\nu} R^- &= -\chi^- \left[T^-_{\mu\nu} + \sqrt{(|g|/|\bar{g}|)} T_{\mu\nu} \right] \end{aligned}$$

Les masses de même signe s'attirent, celles de signes opposés se repoussent. Dans notre cadre, chaque secteur reçoit sa propre relation temps/énergie :

$$\begin{aligned} \text{secteur } + : t &= E^+ / R_0 \quad (E^+ > 0, \text{ donc } t > 0) \\ \text{secteur } - : t^- &= \bar{E} / R^-_0 \quad (\bar{E} < 0) \end{aligned}$$

Option A : $R_0 = R_0$. Alors $\bar{t} < 0$: le secteur jumeau a une flèche du temps inversée, ce qui correspond à l'interprétation de Petit (matière de masse négative et temps inversé). Cette option est cohérente avec la dérivation de Jacobson si le signe « $-$ » de (93) provient du signe de l'énergie ($T_{ab} k^a k^b < 0$) et non d'un signe de l'entropie par aire ($\bar{\eta} = \eta > 0$).

Ce point reste à démontrer ; il n'est pas établi ici. **Option B** : $R_0 = -R_0$ ($\bar{\eta} = -\eta$), qui donne $\bar{t} > 0$ sans inversion, au prix d'un « vide de rigidité négative ».

Le facteur $\sqrt{(|\bar{g}|/|g|)}$ joue, dans le régime stationnaire, le rôle d'une constante de « masse apparente » b^2 (éq. 107). Comment il module R_0 est une question ouverte du modèle.

8. Double causalité et émergence de la conscience : un cadre pour physiciens (spéculatif)

Cette section formalise, sous forme de postulats, une articulation entre le cadre ci-dessus, la « double causalité » de Ph. Guilleminant (le futur influence le présent, le temps vécu émerge de l'interaction entre libre arbitre et lignes temporelles) et la conscience. **Les équations ci-dessous sont les miennes**, pas celles de Guilleminant : elles s'appuient sur des outils établis (formalisme à deux vecteurs d'état d'Aharonov, borne de Landauer, thermodynamique de Jacobson) pour que la partie spéculative soit clairement délimitée.

P1 — Temps émergent. $t = E_{\text{diss}} / R$ (cadre des sections 1-6).

P2 — Deux conditions aux limites. Entre une préparation $|\psi\rangle$ (secteur $+$, flèche $t > 0$) et une post-sélection $\langle\phi|$ (secteur $-$, flèche $t < 0$, option A), l'état « présent » est décrit par le formalisme à deux vecteurs d'état (Aharonov-Bergmann-Lebowitz, 1964) :

$$\langle A \rangle_w = \langle\phi| \hat{A} |\psi\rangle / \langle\phi|\psi\rangle \quad (\text{valeur faible})$$

« Double causalité » = ψ se propage vers l'avenir, ϕ vers le passé ; le présent est leur recouvrement. C'est une reformulation de la mécanique quantique à symétrie temporelle ; l'identification de ϕ avec le secteur jumeau de Janus est une hypothèse.

P3 — Conscience comme structure dissipative anticipatrice. Un système S est dit conscient si (i) c'est une structure dissipative ($\bar{E}_{\text{diss}} > 0$) ; (ii) il intègre l'information ($\Phi > 0$, au sens de la théorie de l'information intégrée) ; (iii) son état est corrélé à la condition finale ϕ au-delà de ce que le passé explique :

$$\Delta = I(S_t ; \phi \mid \text{passé}) > 0 \quad (\text{« rétro-information »})$$

Le libre arbitre est la sélection, par S , d'un ϕ parmi ceux compatibles avec le passé ; les « lignes temporelles » sont l'ensemble de ces ϕ .

P4 — Temps vécu. Le rythme du temps propre d'un système est proportionnel à sa puissance dissipée rapportée à la rigidité locale :

$$d\tau_{\text{vécu}} / dt_{\text{ref}} = \dot{E}_{\text{diss}} / R(r)$$

Le coût plancher de traitement de l'information est la borne de Landauer, $k_B \cdot T \cdot \ln 2$ par bit effacé : à 310 K, $\approx 3 \times 10^{-21}$ J, soit au plus $\approx 7 \times 10^{21}$ bit/s pour les ≈ 20 W du cerveau humain. Ce chiffre borne la quantité d'information que $\dot{E}_{\text{diss}}$ peut intégrer ; il ne fixe pas de seuil de conscience.

P5 — Dédoublément (Garnier Malet). Emplacement réservé : la correspondance entre le « double » temporel et le secteur jumeau ($\bar{t} < 0$) sera ajoutée quand les équations de la théorie du dédoublément seront disponibles.

9. Statut scientifique et tests possibles

Statut. Le modèle Janus est une théorie minoritaire, dont la cohérence théorique (instabilités de type fantôme, identités de Bianchi) et la validation observationnelle sont contestées. La double causalité de Guillemant et la théorie du dédoublément de Garnier Malet ne sont pas reconnues par la communauté de la physique fondamentale ; la première n'est pas soutenue par le CNRS. Les formalismes d'Aharonov, de Landauer et de Jacobson sont, eux, établis. Ce document est un exercice de modélisation : il ne démontre pas que ces théories sont vraies.

Test 1 — Rétro-information (P3). $\Delta > 0$ prédit des corrélations anticipatrices non expliquées par le passé. Les expériences de présentiment (Bem, 2011) n'ont pas été reproduites de façon fiable ; un test sérieux exigerait un protocole pré-enregistré et une analyse bayésienne.

Test 2 — Cosmologie bimétrique (§7). Prédications de Janus : répulsion de la matière jumelle dans les vides, lentilles gravitationnelles associées, ajustement des supernovæ Ia (D'Agostini & Petit, 2018). Ces tests sont à confronter aux données récentes.

Test 3 — Rigidité locale (§5). Écarts de $R(r)$ par rapport à $1/\sqrt{f}$ à haute densité d'énergie. Sans écart mesurable, le modèle reste une reformulation de la relativité générale.

10. Vieillesse, mémoire et téléportation (spéculatif)

Hypothèses principales. Le vieillissement n'a pas de cause unique : les chercheurs décrivent une douzaine de « marqueurs » (López-Otín et al.) qui interagissent. Les hypothèses les mieux soutenues :

- **Perte d'information épigénétique** (Sinclair) : le « logiciel » cellulaire se dégrade, le génome reste à peu près intact. Piste : reprogrammation partielle (facteurs OSK), rajeunissement de tissus chez la souris, essais humains très précoces.
- **Cellules sénescentes** : elles s'accumulent et sécrètent des molécules inflammatoires. Piste : sénolytiques ; bons résultats chez la souris, peu chez l'humain.
- **Signalisation nutritionnelle (mTOR, IGF-1, AMPK)** : restriction calorique, rapamycine, metformine. Effet sur la durée de vie démontré chez plusieurs espèces, pas chez l'humain.
- **Dommages mitochondriaux et stress oxydant** : les antioxydants simples ont globalement échoué chez l'humain.

- **Inflammation chronique et vieillissement immunitaire** (« inflammaging »), **mutations somatiques et télomères**.

État des preuves. Aucune intervention n'a prouvé qu'elle allonge la durée de vie humaine. Les meilleurs leviers établis pour la durée de vie en bonne santé sont l'exercice, le sommeil, l'absence de tabac et la prévention cardiométabolique. Ces connaissances s'arrêtent à 2026 et n'incluent pas de revue systématique des essais en cours.

Rôle de la « mémoire ». Quatre phénomènes à distinguer : (1) mémoire cellulaire : dommages à l'ADN, mutations et marques épigénétiques qui s'accumulent ; (2) mémoire immunitaire : les lymphocytes T mémoire s'accumulent et les cellules naïves s'épuisent, d'où une réponse affaiblie et une inflammation chronique ; (3) mémoire cognitive : la mémoire épisodique et la vitesse de traitement déclinent, l'intelligence cristallisée reste stable ; (4) temps subjectif : le temps semble passer plus vite avec l'âge (moins de nouveautés, donc moins de souvenirs distincts par unité de temps ; hypothèse psychologique, non établie).

Lien avec $t = E_{\text{diss}}/R$. Une lecture possible est le vieillissement comme accumulation d'énergie dissipée de façon irréversible, proche de l'ancienne hypothèse du « rythme de vie ». Cette hypothèse a une limite connue : à métabolisme comparable, oiseaux et chauves-souris vivent bien plus longtemps que les rongeurs. Une formulation moins naïve distingue la dissipation non réparée de la capacité de réparation :

$$d\tau_{\text{bio}}/dt = (\dot{E}_{\text{diss}} - \dot{E}_{\text{rép}}) / R_{\text{bio}}$$

R_{bio} = capacité de réparation et de robustesse de l'organisme

Dans cette lecture, R_{bio} joue pour l'organisme le rôle que R joue pour le vide : une grande robustesse ralentit le « temps biologique » τ_{bio} . Le vieillissement correspond à $\dot{E}_{\text{rép}}$ qui décline avec l'âge ; la reprogrammation partielle revient à remonter R_{bio} ou $\dot{E}_{\text{rép}}$. C'est une analogie de structure, pas une dérivation : R_{bio} n'a pas d'unité mesurable établie ici, et il faudrait le relier à des biomarqueurs (horloges épigénétiques, par exemple) pour le tester. La loi empirique de Gompertz (mortalité qui double environ tous les 8 ans à l'âge adulte) est un premier test : tout modèle de ce type doit la reproduire.

Téléportation. Au sens physique, aucun lien direct. La téléportation quantique transfère un état entre particules avec un canal classique et de l'intrication, sans déplacer de matière, et le théorème de non-clonage interdit de copier l'état sans détruire l'original. Une « téléportation » humaine serait une copie-destruction : problème d'identité et lecture d'environ 10^{28} atomes, hors de portée. Une copie fidèle reproduirait aussi les dommages du vieillissement. Le lien conceptuel est avec la vision informationnelle : reprogrammer, c'est restaurer un état d'information antérieur, sans transfert.

11. Pistes pour rendre le modèle testable

- Une dépendance de R à la densité d'énergie locale au-delà de la forme de Schwarzschild (par exemple via l'énergie noire), qui donnerait des écarts mesurables avec la relativité générale.
- Une prédiction sur les temps de dissipation à très haute densité d'énergie (collisions, cosmologie primordiale).

Valeurs numériques calculées avec les constantes CODATA ($c = 299\,792\,458$ m/s, $G = 6,6743 \times 10^{-11}$ m³ kg⁻¹ s⁻², $\hbar = 1,054571817 \times 10^{-34}$ J·s).