

欧几里得空间

在熟知的三维空间 \mathbb{R}^3 中, 我们可以建立直角坐标系 $Oxyz$. 对于任意的向量 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)^\top$ 和 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)^\top \in \mathbb{R}^3$, 我们有向量的内积 (点乘, 标量积)

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} := a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3.$$

这儿, 我们将把内积记成 (\mathbf{a}, \mathbf{b}) . 内积的几何意义是: 向量 \mathbf{a} 的模长 $|\mathbf{a}|$ 为 $\sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})}$, 而且

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = |\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cdot \cos(\theta),$$

其中的 θ 是向量 \mathbf{a} 与 \mathbf{b} 之间的夹角. 这一套处理方法可以推广到高维情形.

定义 1

设 V 是实数域 \mathbb{R} 上的线性空间. 如果对于 V 内任意两个向量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} 都按照某一法则对应于一个实数, 记作 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in \mathbb{R}$,¹ 满足:

- (对称性) $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$,
- (对于第一位置的线性性) $\lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\lambda\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 以及 $(\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{c}) + (\mathbf{b}, \mathbf{c})$,
- (正定性) 对于任意的 $\mathbf{a} \in V$ 有 $(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$, 且不等式中等号成立的充要条件为 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$,

则称该二元运算法则为 V 上的内积 (inner product), 而 (\mathbf{a}, \mathbf{b}) 称为 \mathbf{a} 与 \mathbf{b} 的内积. 定义了内积的 \mathbb{R} 上的线性空间称为内积空间 (inner product space) 或欧几里得空间, 简称为欧氏空间. 此时, 把线性空间 V 的维数叫作欧氏空间 V 的维数.

¹有些教材里将其记作 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$, 用来与有序对的记号作区别; 这样的记号也许更为合理.

注 2

- ① 从内积的对称性和对于第一位置的线性性, 我们可以马上推出对于第二位置的线性性.
- ② 对于任意的 $\mathbf{a} \in V$, 我们有 $(\mathbf{a}, \mathbf{0}) = (\mathbf{0}, \mathbf{a}) = 0$.
- ③ 同一个线性空间在不同的内积下将被视作不同的内积空间.

内积空间的例子

- ① 对于数组空间 \mathbb{R}^n , 将里面的向量视为列向量. 任取其中两个向量 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)^\top$, $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)^\top$, 我们可以定义

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) := a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \mathbf{a}^\top \mathbf{b}.$$

可以验证, 这是一个内积, 称为 \mathbb{R}^n 的**标准内积** (standard inner product) 或者**欧几里得内积**. 若不作特别说明的话, **我们默认** \mathbb{R}^n 为采用了如此定义的内积空间. 当然, 对于给定的一个元素全为正的向量 $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top$, 我们也可以定义 \mathbb{R}^n 上的一个新的内积为

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}) := \sum_{i=1}^n a_i b_i w_i.$$

其中这些标量 w_i 称为这个新的内积的**权** (weights).

内积空间的例子

- ② 设 V 是 \mathbb{R} 上的 n 维线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为 V 的一组基. 对于任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, 设它们在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标分别为 $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)^\top$ 和 $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)^\top$, 即 $\mathbf{x} = \sum_i x_i \alpha_i$, $\mathbf{y} = \sum_i y_i \alpha_i$. 定义

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \sum_i x_i y_i,$$

即 \mathbb{R}^n 中的向量 \mathbf{X} 与 \mathbf{Y} 之间的标准内积. 不难验证, 这给出了 V 上的一个内积.

- ③ 由全体 $m \times n$ 实矩阵构成的线性空间 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 中, 定义一个二元函数为

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) := \operatorname{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{B}).$$

容易验证, 该二元函数是 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 上的一个内积.

内积空间的例子

- ④ $C[a, b]$ 为有界闭区间 $[a, b]$ 上的实连续函数的全体, 是 \mathbb{R} 上的无穷维线性空间. 这儿假定 $a < b$. 对于 $f, g \in C[a, b]$, 定义

$$(f, g) := \int_a^b f(x)g(x) \, dx.$$

这给出了 $C[a, b]$ 的一个内积. 为了验证正定性, 我们注意到

$$(f, f) = \int_a^b f(x)^2 \, dx \geq 0.$$

若存在 $[a, b]$ 中某个 x_0 满足 $f(x_0) \neq 0$, 那么由函数 f^2 的连续性可知, 存在 $[a, b]$ 中包含 x_0 的小区间 I , 使得在 I 上有 $f^2 \geq \frac{f(x_0)^2}{2}$.

内积空间的例子

此时, 若令 I 的长度为 $p > 0$, 那么

$$(f, f) = \int_a^b f(x)^2 dx \geq \int_I f(x)^2 dx \geq \frac{f(x_0)^2 p}{2} > 0.$$

这说明若 $(f, f) = 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上必为零函数.

更一般地, 若 $w(x) \in C[a, b]$ 是一个正的连续函数, 那么

$$(f, g) := \int_a^b f(x)g(x)w(x) dx$$

给出了 $C[a, b]$ 的一个新的内积, 而 $w(x)$ 称为该内积的**权函数** (weight function).

内积空间的例子

- ⑤ 对于 $F = \mathbb{R}$, 我们考虑线性空间 $F_n[x]$. 这是次数不超过 n 的实系数多项式构成的实线性空间. 设 a_0, a_1, \dots, a_n 为不同的实数, 对于 $f, g \in F_n[x]$, 定义

$$(f, g) := \sum_{i=0}^n f(a_i)g(a_i).$$

这给出了 $F_n[x]$ 的一个内积. 为了验证**正定性**, 我们注意到

$$(f, f) = \sum_{i=0}^n f(a_i)^2 \geq 0.$$

若 $(f, f) = 0$, 则 a_0, a_1, \dots, a_n 为 $f(x)$ 的不同的根. 而 $f(x)$ 的次数不超过 n , 这说明 f 必为零多项式.

内积空间的例子

更一般地, 若 w_0, w_1, \dots, w_n 为一组正数, 那么

$$(f, g) := \sum_{i=0}^n f(a_i)g(a_i)w_i$$

也定义了 $F_n[x]$ 上的一个内积.

定理 3 (Cauchy-Schwarz)

设 V 是欧氏空间, (\cdot, \cdot) 是 V 的内积, 则对 V 中的任意两个向量 \mathbf{a} 和 \mathbf{b} , 有

$$|(\mathbf{a}, \mathbf{b})| \leq \sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})(\mathbf{b}, \mathbf{b})}.$$

注 4

- ① 由证明过程易知, *Cauchy-Schwarz* 不等式中等号成立的条件是向量 \mathbf{a} 与 \mathbf{b} 线性相关.
- ② 将 *Cauchy-Schwarz* 不等式运用于前面的第1个例子, 我们得到, 若 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{R}$, 则

$$|a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n| \leq \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2} \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2}.$$

- ③ 将 *Cauchy-Schwarz* 不等式运用于前面的第4个例子, 我们得到, 若 $f(x), g(x) \in C[a, b]$, 则

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) \, dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(x)^2 \, dx} \sqrt{\int_a^b g(x)^2 \, dx}.$$

定义 5

设 V 是欧氏空间, (\cdot, \cdot) 是 V 的内积, $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$. 仿照三维的情形, 我们定义如下.

- ① $|\mathbf{a}| := \sqrt{(\mathbf{a}, \mathbf{a})} \geq 0$ 称为 \mathbf{a} 的**长度** (*length*) 或**模** (*module*). 有时模也记作 $\|\mathbf{a}\|$.² 由内积的正定性容易推出, $\|\mathbf{a}\| = 0$ 当且仅当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$. 另外, 对任意的 $\lambda \in \mathbb{R}$, 我们都有 $\|\lambda\mathbf{a}\| = |\lambda| \cdot \|\mathbf{a}\|$.
- ② 两个非零向量 \mathbf{a} 与 \mathbf{b} 之间的**夹角** 为 $\theta = \arccos \left(\frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|} \right)$. 注意, 由 *Cauchy-Schwarz* 不等式, 我们有

$$-1 \leq \frac{(\mathbf{a}, \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|} \leq 1,$$

从而定义是可行的.

²为了与标量的绝对值以示区别, 在我们的教案里会采用这一记号.

- ③ 进一步地, 若 $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$ (允许 \mathbf{a}, \mathbf{b} 为 $\mathbf{0}$), 则称 \mathbf{a} 与 \mathbf{b} 垂直 (perpendicular) 或正交 (orthogonal), 记作 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$. 容易验证, $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 当且仅当 $\mathbf{b} \perp \mathbf{a}$, 当且仅当勾股定理 (也被称为毕达哥拉斯定理) 成立:

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2.$$

另外, 零向量 $\mathbf{0}$ 与 V 中任意的向量都正交, 并且是 V 中满足这一条件的唯一的向量, 也是 V 中唯一的与自身正交的向量.

- ④ 长度为 1 的向量称为单位向量.

⑤ 向量 α 与 β 之间的距离定义为 $d(\alpha, \beta) := \|\alpha - \beta\|$. 我们很容易验证:

$$(\text{对称性}) \quad d(\alpha, \beta) = d(\beta, \alpha),$$

$$(\text{正定性}) \quad d(\alpha, \beta) \geq 0, \text{ 且 } d(\alpha, \beta) = 0 \text{ 当且仅当 } \alpha = \beta,$$

$$(\text{三角不等式}) \quad d(\alpha, \beta) \leq d(\alpha, \gamma) + d(\beta, \gamma).$$

容易看出,

关于距离的三角不等式

$$\xleftrightarrow[\mathbf{b}=\gamma-\beta]{\text{记 } \mathbf{a}=\alpha-\gamma} \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\| \quad (\text{模的三角不等式})$$

$$\Leftrightarrow \|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 \leq (\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|)^2$$

$$\Leftrightarrow (\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b}) \leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2$$

$$\Leftrightarrow (\mathbf{a}, \mathbf{a}) + (\mathbf{a}, \mathbf{b}) + (\mathbf{b}, \mathbf{a}) + (\mathbf{b}, \mathbf{b}) \leq (\mathbf{a}, \mathbf{a}) + 2\|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| + (\mathbf{b}, \mathbf{b})$$

$$\Leftrightarrow (\mathbf{a}, \mathbf{b}) \leq \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\|. \quad (\text{Cauchy-Schwarz 不等式})$$

内积的表示与标准正交基

回忆

设 V 是有限维向量空间, \mathcal{A} 为 V 上的线性变换, 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵为 \mathbf{A} , 则 \mathcal{A} 的具体作用由 \mathbf{A} 唯一决定.

若 V 是有限维欧氏空间, 对于其上的内积, 我们也有类似地表述.

设 (\cdot, \cdot) 是 V 上的内积, 任给 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, 假定它们在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标分别为 $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)^T$ 和 $\mathbf{Y} = (y_1, \dots, y_n)^T$, 我们有

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \alpha_i, \sum_{j=1}^n y_j \alpha_j \right) \xrightarrow{\text{双线性性}} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j (\alpha_i, \alpha_j).$$

令 $\mathbf{G} = (g_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 其中 $g_{ij} = (\alpha_i, \alpha_j)$. 则上式可以表述成

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{X}^T \mathbf{G} \mathbf{Y}.$$

注意, 由内积的对称性, 有 $(\alpha_i, \alpha_j) = (\alpha_j, \alpha_i)$, 即 $g_{ij} = g_{ji}$. 这说明方阵 \mathbf{G} 是实对称阵. 在接下来的讨论中, 方阵 \mathbf{G} 将被称为内积 (\cdot, \cdot) 在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的度量矩阵.

定义 6

对于 n 阶实对称阵 \mathbf{A} , 若是对于任意的非零列向量 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^n$, 皆有 $\mathbf{X}^T \mathbf{A} \mathbf{X} > 0$, 则称 \mathbf{A} 是一个正定方阵.

故由内积的正定性, 知其度量矩阵 \mathbf{G} 必为一个正定方阵.

反过来, 给定 \mathbb{R} 上的有限维线性空间 V 和上面的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 以及一个 n 阶正定的实对称方阵 \mathbf{G} , 可以定义 V 上的一个内积如下. 任给 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in V$, 假定它们在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标分别为 \mathbf{X} 和 \mathbf{Y} , 定义 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \mathbf{X}^T \mathbf{G} \mathbf{Y}$. 则 V 变成了一个内积空间.

很自然的问题: 在考虑线性空间 V 的一组新的基时, 线性变换相应的矩阵要做相似变换. 那么对于内积而言, 相应的度量矩阵该如何改变?

引理 7

设 $A, B \in F^{n \times n}$. 则 $A = B$ 当且仅当对于任意的 n 维列向量 X, Y , 有 $X^T A Y = X^T B Y$.

设 β_1, \dots, β_n 是欧氏空间 V 的另外一组基. 设 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 到 β_1, \dots, β_n 的过渡矩阵为 P , 即有

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)P.$$

设内积在 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 和 β_1, \dots, β_n 下的度量矩阵分别为 G, \tilde{G} . 对于任意的 $x, y \in V$, 假设它们在基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 下的坐标分别为 X, Y . 从而, 它们在基 β_1, \dots, β_n 下的坐标分别为 $\tilde{X} = P^{-1}X$ 和 $\tilde{Y} = P^{-1}Y$. 由定义, 有

$$\boxed{X^T G Y} = (x, y) = \tilde{X}^T \tilde{G} \tilde{Y} = \boxed{X^T (P^T)^{-1} \tilde{G} P^{-1} Y}.$$

由上面的引理可知, 这说明 $G = (P^T)^{-1} \tilde{G} P^{-1}$, 即

$$\tilde{G} = P^T G P.$$

定义 8

给定两个同阶方阵 A 和 B . 若存在可逆矩阵 P 使得 $A = P^T B P$, 则称 A 是 B 由相合变换 (congruent transformation) 得到的, 称 A 与 B 是相合的.