

- (1) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程, ()
- a. $\{N(t), t \geq 0\}$ 一定是平稳过程; ()
- b. 给定 $N(t) = n > 0$, 则第 n 个事件的到达时间服从区间 $[0, t]$ 上的均匀分布; ()
- c. $\{M(t), t \geq 0\}$ 是另一个强度为 $\gamma > 0$ 的 Poisson 过程, 则 $\{N(t) + M(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda + \gamma$ 的 Poisson 过程; ()
- (2) 假设一个马氏链的所有状态都是常返的, i 和 j 是两个状态且 $i \rightarrow j$, 则 ()
- a. $j \rightarrow i$; ()
- b. $P_{ij} > 0$ 或 $P_{ji} > 0$; ()
- c. $\sum_{i=1}^{\infty} P_{jj}^{(i)} < \infty$; ()
- (3) 下列关于 τ 的函数 $R(\tau)$ 是否可能作为平稳过程或平稳序列的协方差函数 ()
- a. $R(\tau) = e^{-|\tau|}(\tau^2 + 2|\tau| - 1)$; ()
- b. $R(\tau) = \begin{cases} 1/|\tau|, & \tau \neq 0 \\ 1, & \tau = 0 \end{cases}$; ()
- c. $R(\tau) = |\tau|e^{-\tau^2/2}$; ()
- (4) 设 $\{X_n, n \in N\}$ 是一个马氏链, 状态空间为 S . 下面说法是否正确. ()
- a. $P_{ij}^{(n)} \geq f_{ij}^{(n)}$, 其中 $i, j \in S, n \in N$; ()
- b. 如果状态 i, j 是互达的, 则存在 n 使得 $P_{ij}^{(n)} > 0, P_{ji}^{(n)} > 0$; ()
- c. 如果转移概率矩阵的所有行相同, 则所有状态是属于相同的类; ()
- d. 如果 $f_{ij} < 1, f_{ji} < 1$, 则 i, j 不是互达的; ()

1. 设 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 为一不可约、有限 (N 个) 状态的 Markov 链, 且其转移概率矩阵 P 为双随机 (行和与列和均为 1), 则判断是非:
- (1) X 的平稳分布不一定存在 (2) X 的平稳分布存在但不必唯一
- (3) X 的平稳分布为 $\left(\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N}\right)$ (4) X 的极限分布为 $\left(\frac{1}{N}, \frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N}\right)$

随机过程应考复习

一、Poisson 过程

2016-2017 秋

(1) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda > 0$ 的 Poisson 过程, 则 $\text{Cov}(N(t), N(s)) = \underline{\hspace{2cm}}$.

(3) 设某路口白、红、灰三种颜色的汽车的到达数量分别为强度为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的 Poisson 过程到达, 且相互独立。若不论颜色, 第一辆汽车平均到达时间为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 第一辆红色汽车的平均到达时间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- (4) 设 $[0, t]$ 内到达某商店门口的顾客数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 $\lambda > 0$ 的Poisson过程, 每个达到的顾客依概率 p 进入店内, 以概率 $1 - p$ 不进店即离开, 且顾客是否进店是相互独立的; 进店的每个顾客又独立地以概率 q 进行消费, 以概率 $1 - q$ 不消费。则进店的顾客数的均值和方差为_____和_____; 消费的顾客数的均值和方差为_____和_____。

二、(16分) 设某人甲负责订阅杂志, 前来订阅的顾客数是日均到达率为6的泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 。

若每个顾客的订阅季数 $Y \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$, 且各人的选择相互独立。设 $N_i(t)$ 为订阅 i 季杂志的顾客人数, $i = 1, 2, 3$. 并以 $\{X(t)\}$ 表示到时刻 t 为止甲所得全部手续费(假设每订出一季杂志, 甲可得手续费1元),

- (1) 问 $N_i(t)$, $i = 1, 2, 3$ 分别是什么过程? 它们是否相互独立?
- (2) 试求: $E[X(t)]$, $Var(X(t))$, 及 $X(t)$ 的矩母函数 $g_{X(t)}(u) = E[e^{uX(t)}]$.

2016-2017 春

2. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 λ 的Poisson过程, 则 $E[N(1)N(2)] =$ _____;
 $E[N(10)|N(5)] =$ _____; 若又已知 $N(3) = 1$, 则 $P(N(2) - N(1) = 1) =$ _____.
3. 假定某天文台观测到的流星流是一个Poisson过程, 据以往资料统计为每小时平均观测到3颗流星. 则在晚上8点到10点期间, 该天文台没有观察到流星的概率是_____. 凌晨0点后该天文台观察到第一颗流星的时间的分布是_____.
8. 关于平稳过程, 下列说法正确的是().
 (A) 宽平稳过程具有平稳增量性
 (B) Poisson过程是宽平稳过程
 (C) 初始状态服从平稳分布的Markov过程为严平稳过程
 (D) 严平稳过程一定是宽平稳过程

二、(12分) 假设一个电子管内到达阳极的电子数目 $N(t)$ 服从参数为 λ 的Poisson过程, 每个电子携带能量相互独立且与电子数目 $N(t)$ 相互独立, 并均服从区间 $[1, 2]$ 上的均匀分布, 设到 t 时刻的阳极接受的能量为 $S(t)$. 求 $S(t)$ 的均值 $E[S(t)]$ 和方差 $Var[S(t)]$.

- 三、(20分) 现有红色、黄色、蓝色三种汽车, 分别按强度为 λ_1 , λ_2 和 λ_3 且相互独立的Poisson过程通过公路上的某观察站,
- (1) 若不论颜色, 求第一辆车通过该观察站所需的时间的概率密度函数与期望;
 - (2) 在已知时刻 t_0 观察到一辆红车的条件下,
 (a) 下一辆仍是红车的概率是多少? (b) 下一辆是黄车的概率是多少?
 - (3) 已知时刻 t_0 观察到一辆红车的条件下, 接下来通过的 k 辆全是红车, 而后是非红车的概率是多少? ($k \geq 0$)
 - (4) 在相继两辆红车之间通过该观察站的蓝车恰有 n 辆的概率, $n = 0, 1, 2, \dots$.

2019 期末

- (3) 设有复合泊松过程 $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$, 其中 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程, $Y_i \sim \text{Exp}\{\mu\}$. 则:
 $EX(t) =$ _____, $E[X^2(t)] =$ _____, $g_{X(t)}(s) = E \exp\{sX(t)\} =$ _____.

二、(8分)保险公司的理赔次数 $N(t)$ 是强度为 λ 的泊松过程，诸次理赔额 $C_i(i \geq 1)$ 为独立同分布，且与 $N(t)$ 独立， $EC_i = \mu$ 。又设 W_i 为第 i 次理赔发生的时间($i \geq 1$)，则到时刻 t 为止的理赔总额的折现值为：

$$C(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} C_i e^{-\alpha W_i}$$

其中 $\alpha > 0$ 为折现率，试求 $C(t)$ 的期望值。

(1) 设 X 与 Y 相互独立，分别服从指数分布 $Exp\{\lambda\}$ 与 $Exp\{\mu\}$ ，则：

- (a) $X + Y \sim Exp\{\lambda + \mu\}$. () (b) $\min\{X, Y\} \sim Exp\{\lambda + \mu\}$. ()
(c) $\max\{X, Y\} \sim Exp\{\lambda + \mu\}$. () (d) $P\{X > h\} = 1 - \lambda h + o(h), h \downarrow 0$. ()
(e) $P\{X \leq s + t \mid X > s\} = P\{X \leq t\}, s, t > 0$. ()

2019.1.10

(3) (填空) 设 X_1, X_2, X_3 相互独立，且 $X_i \sim Exp(\lambda_i), i = 1, 2, 3$ (指数分布)，则

$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, X_3\}$ 的分布为 ()，概率 $P\{X_1 = X_{(1)}\}$ 等于 ()。

(4) (填空) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一强度为 λ 的 Poisson 过程， W_k 为其第 k 个事件发生的时间，并设 $1 \leq k \leq n, t > 0$ ，则 $E\{W_k \mid N(t) = n\} = ()$ ， $E(W_k) = ()$ 。

二、(8分) 假设汽车按强度为 λ 的泊松过程进入一条单向行驶的无限长的公路，进入的第 i 辆车以速度 V_i 行驶。假定诸 V_i ($i \geq 1$) 为相互独立的正随机变量，有共同分布 F 。

试求在时刻 t 位于区间 (a, b) 内的平均汽车辆数。

2020.1.6

(4) 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是强度为 λ 的泊松过程，命 $X_T = \frac{1}{T} \int_0^T X(t) dt$ ，则：

$E(X_T) = ()$ ， $Var(X_T) = ()$ 。

(3) 到达某邮箱的正常电子邮件和垃圾邮件数分别是强度为9和3的泊松过程，且相互独立。则第一封邮件的平均到达时间为 ()，第一封垃圾邮件到达之前恰好到达了 k 封正常邮件的概率为 ()。

(5) 到达某商店的顾客数 $N(t)$ 是一强度为 $\lambda(t) = 2 + t/2$ 的非齐次泊松过程，若该商店早上8:00开门，则午时段(11:00-13:00)没有顾客到达的概率为()，午时段到达商店的平均人数为()。

二、(15分) 设某种健康险投保者中的出险人数 $N(t)$ 为一强度为 5 的泊松过程, 若以

Y_i 表示第 i 个出险者应获赔偿, 并假定 $Y_i \sim U(1, 3)$ (均匀分布, 单位: 万元), 且 $\{Y_i, i \geq 1\}$

为 i.i.d., 试求到时刻 t 为止保险公司应付全部赔偿 $X(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} Y_i$ 的期望 $EX(t)$ 、方差

$Var[X(t)]$ 及矩母函数 $g_{X(t)}(s)$ 。(均匀分布矩母函数: $g(s) = \frac{e^{bs} - e^{as}}{(b-a)s}$)

二、平稳过程

2016-2017 秋

- (5) 设 $X(t) = A \sin(2\pi\Theta_1 t + \Theta_2)$, A 为常数, Θ_1, Θ_2 为相互独立的随机变量, Θ_1 的密度函数为一个偶函数, 而 Θ_2 服从区间 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 则其均值函数为_____, 协方差函数为_____, 从而该过程为_____。

五、(16分) 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 的均值函数为 0, 谱密度函数为

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 5}{\omega^4 + 11\omega^2 + 24}, \quad -\infty < \omega < \infty.$$

- (1) 求 $X(t)$ 的协方差函数 $R(\tau)$;
(2) $X(t)$ 是否有均值遍历性? 为什么?

2017 年春

- 五. (8分) 设 $X(t) = Y \cos(\omega t + \Theta)$, 其中 ω 为常数, Y 服从均值为 μ , 方差为 σ^2 正态分布, Θ 服从区间 $[0, 2\pi]$ 上的均匀分布, 且 Y 与 Θ 相互独立. 试判断 $X(t)$ 是否为宽平稳过程。如是, 请给出证明; 否则, 请说明原因。

六. (16分) 已知平稳过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$ 的均值函数为 0, 谱密度函数为

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 + 10\omega^2 + 21}, \quad -\infty < \omega < \infty.$$

- (1) 求 $X(t)$ 的协方差函数 $R(\tau)$;
(2) $X(t)$ 是否有均值遍历性? 为什么?

2019 年期末

- (2) 关于平稳过程, 下列说法是否正确
- (a) 宽平稳过程具有平稳增量性. ()
- (b) Poisson过程是平稳过程. ()
- (c) 二阶矩存在的严平稳一定是宽平稳过程. ()
- (d) 初始状态分布为平稳分布的Markov过程一定是严平稳的. ()

1. 判断是非。设 $X_0 = 0, X_n = \sum_{i=1}^n \xi_i, (n \geq 1)$, 其中 $\{\xi_i, i \geq 1\}$ 为独立同分布, 且 $P\{\xi_i =$

$-1\} = P\{\xi_i = 1\} = 0.5$, 则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为:

A. 独立增量过程 () B. 平稳独立增量过程 () C. 常返马氏链 ()

D. 瞬过马氏链 () E. $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = 0\} = 0$ ()

五、(15 分) 设 A 与 Θ 独立且分别服从均匀分布 $U(0, 1)$ 与 $U(0, 2\pi)$, 定义过程:

$$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta) \quad (t \in R, \omega_0 \text{ 为非零常数})$$

(1) 证明 $\{X(t), t \in R\}$ 为宽平稳过程;

(2) 试求其功率谱密度函数 $S(\omega)$ 。

六、(12 分) 设平稳过程 $X = \{X(t), t \in R\}$ (均值为 0) 的功率谱密度函数为:

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 3}{\omega^4 + 11\omega^2 + 28}$$

(1) 试求 X 的协方差函数 $R(\tau)$;

(2) 问 X 的均值是否有遍历性? 为什么?

2019.1.10

(2) (是非) 下列关于 τ 的函数 $R(\tau)$ 是否为(实或复)平稳过程的协方差函数?

(a) $R(\tau) = e^{-|\tau|}(|\tau| + 1)^2$ (); (b) $R(\tau) = |\tau| e^{-\tau^2/2}$ (); (c) $R(\tau) = \frac{\sin \tau}{\pi \tau}$ ()

(d) $R(\tau) = \sigma^2 e^{i\lambda \tau}$ (); (e) $R(\tau) = \sigma^2 e^{-i\lambda |\tau|}$ ()。(注: $\sigma, \lambda > 0, i = \sqrt{-1}$)

五、(15 分) 设 A 与 Θ 独立且分别服从均匀分布 $U(0, 1)$ 与 $U(0, 2\pi)$, 定义过程:

$$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta) \quad (t \in R, \omega_0 \text{ 为非零常数})$$

(1) 证明 $\{X(t), t \in R\}$ 为宽平稳过程;

(2) 试求其功率谱密度函数 $S(\omega)$ 。

六、(12分) 设平稳过程 $X = \{X(t), t \in R\}$ (均值为 0) 的功率谱密度函数为:

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 3}{\omega^4 + 11\omega^2 + 28}$$

(1) 试求 X 的协方差函数 $R(\tau)$;

(2) 问 X 的均值是否有遍历性? 为什么?

2019 期末

五、(15分) 考察下列函数 $S_i(\omega), (\omega \in R)$:

$$\begin{aligned} S_1(\omega) &= \frac{\omega^2 + 9}{(\omega^2 + 4)(\omega + 1)^2}, & S_2(\omega) &= \frac{\omega^2 + 1}{\omega^4 + 5\omega^2 + 6}, & S_3(\omega) &= \frac{\omega^2 + 4}{\omega^4 - 4\omega^2 + 3}, \\ S_4(\omega) &= \frac{\omega^2 - 4}{\omega^4 + 4\omega^2 + 3}, & S_5(\omega) &= \frac{e^{-i\omega^2}}{\omega^2 + 2} (i = \sqrt{-1}), & S_6(\omega) &= \frac{4a \cos \omega}{\omega^2 + a^2} (a > 0). \end{aligned}$$

(1) 问哪些可以作为平稳过程的谱密度函数? 并进而求出其对应的协方差函数 $R(\tau)$.

(2) 问相应的平稳过程的均值是否有遍历性? 为什么?

六、(7分) 设

$$X_t = S_t + \varepsilon_t = b \cos(\omega t + U) + \varepsilon_t, \quad t \in \mathbb{Z}$$

其中 $U \sim U(0, 2\pi)$, $\{\varepsilon_t\}$ 零均值平稳, 方差为 σ^2 的白噪声序列, U 与 $\{\varepsilon_t\}$ 独立. 作矩形窗滤波, $M > 0$:

$$Y_t = \frac{1}{2M+1} \sum_{j=-M}^M X_{t-j}$$

1) 试问 Y_t 是平稳过程吗? 为什么?

2) 求出 Y_t 的方差.

2020 年 1 月

(2) 下列函数是否为平稳过程的谱密度函数:

$$a. S_1(\omega) = \frac{\omega^2 - 16}{\omega^4 + 11\omega^2 + 18} \quad (\quad); \quad b. S_2(\omega) = \frac{\omega^2 + 1}{\omega^4 + 5\omega^2 + 6} \quad (\quad);$$

$$c. S_3(\omega) = \frac{\omega^2 \cos \omega}{\omega^4 + 1} \quad (\quad); \quad d. S_4(\omega) = \frac{e^{-i|\omega|}}{\omega^2 + a^2}, (i = \sqrt{-1}) \quad (\quad)$$

五、(15分) 设 A 与 Θ 独立, $A \sim \text{Exp}(1/3)$ (指数分布), $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ (均匀分布), 定义随机过程:

$$X(t) = A \cos(t + \Theta), \quad (t \in R)$$

(1) 证明 $\{X(t), t \in R\}$ 为宽平稳过程;

(2) 试求其功率谱密度函数 $S(\omega)$ 。

六、(10分) 设平稳过程 $X = \{X(t), t \in R\}$ (均值为 0) 的功率谱密度函数为:

$$S(\omega) = \frac{\omega^2 + 3}{\omega^4 + 11\omega^2 + 28}$$

- (1) 试求 X 的协方差函数 $R(\tau)$;
- (2) 问 X 的均值是否有遍历性? 为什么?

三、马氏过程

2016-2017 秋

(2) (判断是非) 设有 $m \geq 1$ 使得对于马氏链的所有状态 i , 有 $P_{i,j}^{(m)} > 0$, 则:

- A $d(j)|m$, 其中 $d(j)$ 为 j 的周期; ()
- B $d(j) = m$; ()
- C j 是非周期的; ()
- D j 的周期为无穷; ()

(6) 设马氏链的状态 i 是周期为 d 的常返状态, μ_i 为状态 i 的平均常返时, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ii}^{(nd)} =$ _____。

三、(20分) 设有夏普、大金两个品牌的空气净化器在某地市场占有率开始时 ($n = 0$) 均为 $1/3$ (其他品牌总的市场占有率为 $1/3$). 而每过一个月 (单位时间) 顾客消费倾向的改变可以用一个三状态的马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 来描述, 其一步转移概率 (状态 1、2、3 分别表示购买夏普、大金、其他品牌的空气净化器) 如下图所示。

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0 \\ 0.35 & 0.3 & 0.35 \\ 0 & 0.2 & 0.8 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

- (1) 证明该链为不可约、遍历的;
- (2) 问两个月后各品牌的市场占有率将变成多少?
- (3) 各品牌对市场的占有率最终会稳定于什么样的比例?

四、(16分) 逐个随机地把球放入到 a 个盒子中去 (可重复放), 以 X_n 表示放了 n 个球之后的空盒数, 则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为马氏链,

- (1) 写出该马氏链的转移概率矩阵 P , 并进行状态分类;
- (2) 试求放满 a 个盒子的平均时间 (次数)。

2017 秋

4. 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一个Markov 链, 且一步转移概率矩阵为

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.5 & 0.5 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

若 X_0 的分布律为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \end{pmatrix}$, 则 X_2 的分布律为_____; 且该Markov 链的平稳分布为_____.

5. 在离散时间Markov 链中, 关于常返性下列说法正确的是().

- (A) 若状态 i 常返且 $j \rightarrow i$, 则状态 j 也是常返的
- (B) 若状态 i 常返且 $i \rightarrow j$, 则状态 j 不一定是常返的
- (C) 若状态 i 零常返, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)}$ 一定存在
- (D) 若状态 i 正常返, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ii}^{(n)}$ 一定存在

6. 关于离散时间Markov 链的平稳分布和极限分布, 下列说法正确的是().

- (A) 只要有正常返类, 则必有平稳分布
- (B) 平稳分布和极限分布都存在, 则它们必相等
- (C) 极限分布若存在则与 X_0 的取值无关
- (D) 平稳分布若存在则必唯一

7. 关于直线上的简单对称随机游动 $\{X_n, n \geq 0\}$, 下列说法错误的是().

- (A) 所有状态的周期均为2
- (B) $\{X_n, n \geq 0\}$ 为一个Markov 链且无平稳分布
- (C) 若 $X_0 = 0$, 则对任意整数 n , 其最终能到达它的概率为1
- (D) 若 $X_0 = 0$, 则其首次返回原点所需平均时间是有限的

四. (15分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$ (全体非负整数), 转移概率为

$$P_{i,i+1} = P_{i,0} = \frac{1}{2}, \quad i \geq 0.$$

- (1) 证明该马氏链为不可约遍历的;
- (2) 试求该马氏链的极限分布 $\pi = \{\pi_i, i \geq 0\}$ 。

2019 . 1.10

(1) (是非) 若马氏链 $X = \{X_n, n \geq 0\}$ 的初始分布 $\pi = \{\pi_j, j \geq 0\}$ 为其平稳分布, 则:

(a) $\sum_{i \geq 0} \pi_i p_{i,j}^{(n)} = \pi_j, (j \geq 0, n \in N)$ () ; (b) X 为严格平稳过程 ()

(c) $\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} p_{i,j}^{(n)}, (i, j \geq 0)$ () ; (d) X 必有正常返状态 ()。

三、(15分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的转移概率为:

$$p_{0,j} = a_j > 0, (j \geq 0) \quad p_{i,i-1} = 1, (i \geq 1)$$

(1) 证明该马氏链为不可约常返的, 且为非周期;

(2) 试求过程由 0 出发后首次返回到 0 的平均时间 μ_0 , 并据以回答: 过程何时为正常

返? 何时为零常返?

(3) 在正常返时, 试求该马氏链的极限分布: $\pi = \{\pi_i, i \geq 0\}$ 。

四、(20分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的一步转移概率矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 2 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 试讨论该马氏链的状态分类(即: 分为几个等价类、各类的周期性如何、是否为常返、是否为正常返?)。

(2) 试求过程由状态 k 出发而被状态 j 吸收的概率 $f_{k,j}$, ($k=1,2; j=3,4$)。

2019 期末

(4) 现有对于一个三状态的马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的 25 个连续观察数据:

$$\begin{aligned} & -1, 0, 0, 1, 0, -1, -1, -1, 0, 0, -1, 0, -1, \\ & -1, -1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, -1, 1, 1, 1, \end{aligned}$$

则据此可估计出该马氏链的转移概率矩阵 P 为_____。

三、(20分) 质点在一正 N 边形 ($N \geq 3$) 的周边上作随机游动(顶点 $1, 2, \dots, N$ 按顺时针方向排列), 质点以概率 p 顺时针游动一格, 以概率 $q = 1 - p$ 逆时针游动一格, 试用一马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 描述该模型, 并

(1) 写出该马氏链的转移概率矩阵 P , 并作状态分类;

四、(20分) 设马氏链 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的转移概率矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.6 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \\ 2 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.2 & 0.1 \\ 3 & 0 & 0 & 0.2 & 0.4 & 0.4 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(1) 试对该马氏链作状态分类(分为几类、各类的周期性、常返性、正常返性等);

(2) 试求过程从状态 k 出发而被状态 4 吸收的概率 $f_{k,4}$ 及 $f_{k,5}$, ($k = 1, 2, 3$)。

2020.1.6

三、(18分) 圆周上有 1,2,3,4 四个位置按顺时针方向排列, 一个粒子在这四个位置上(沿圆周)作随机游动。它从任何一个位置各以概率 0.5 顺时针方向或逆时针方向游动至其相邻位置, 若以 $X_n = j$ 表示时刻 n 粒子处于位置 j ($j=1,2,3,4$), 则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为一马氏链,

(1) 求该马氏链的转移概率矩阵 P 及 $P^{(2)}$, 并求 $P\{X_{n+3} = 3, X_{n+1} = 1 | X_n = 2\} = ?$

(2) 讨论该马氏链状态分类并求其平稳分布 $\pi = (\pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4)$;

(3) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} P^{(n)}$ 是否存在? 为什么?

四、(12分) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 为区间 $[0, 3]$ 上的随机游动, 其转移概率矩阵为:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

试求粒子由 k 出发而被 0 吸收的概率 p_k 及它被吸收的平均步数 v_k , ($k=1,2,3$)。