



倍立克軟膏

BETASALIC OINTMENT

衛署藥製字 第 045289 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-12-05

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gram contains:

Betamethasone(as dipropionate).....0.5 mg

Salicylic acid.....30 mg

1.2 賦形劑

White Petrolatum, Mineral Oil Light.

1.3 劑型

軟膏劑

1.4 藥品外觀

類白色軟膏

2 適應症

慢性異位性皮膚炎、神經性皮膚炎（單純苔癬）、牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、頭皮皮脂漏皮膚炎、汗皰、尋常性魚鱗癬等發炎症狀之解除。

3 用法及用量

3.1 用法用量

一日2次，早晚薄敷於患處。


4 禁忌

對本品任一成份有過敏病史者禁用。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

1. 如有刺激或過敏發生則應停用本品。
2. 如有感染發生應給予適當治療。
3. 全身性副作用為腎上腺抑制。
4. 如有乾燥及刺激感出現，則停用本品。
5. 本品不可眼用。
6. 急性皮質類固醇過多乃可逆反應，只需停用本品即可。如有需要，可作適當處理來治療電解質不平衡。柳酸中毒時只需停用柳酸，再口服碳酸氫鈉來中和尿液並利尿。
7. 長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作(局部類



固醇戒斷反應)。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

孕婦使用的安全性尚未建立，故勿讓孕婦大量或長期使用本品。

6.4 小兒

當封閉包紮或身體大面積使用本品時，可能有全身性副作用出現，尤其嬰兒及小孩。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

1. 灼熱、癢、刺激、乾燥、起泡、多毛、低色素沉著、口周圍皮膚炎、過敏性、接觸性皮膚炎。如在封閉包紮下，會有以下狀況發生：皮膚浸軟、二次感染、皮膚萎縮、皺褶、起疹、癬。水楊酸可能引起皮膚炎。
2. 皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅、可能會蔓延超出初始治療區域、灼熱或刺痛感、搔癢、皮膚脫屑、滲膿。

9 過量

過量長期使用會抑制下視丘—腦下垂體功能，引起腎上腺功能抑制。長期過量使用本品會引起柳酸中毒。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

倍立克軟膏每公克含0.64公絲betamethasone dipropionate，相當於0.5公絲(0.05%) Betamethasone和30公絲(3%) Salicylic acid。Betamethasone Dipropionate，乃一合成的氟化皮質類固醇，具抗發炎、止癢和血管收縮的作用。倍立克軟膏效果可持續很長，故一日只需使用2次。

10.2 藥效藥理特性

詳見10.1 作用機轉。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

111.12.05

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1000公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

應儲存於25°C以下。

製造廠

中生生技製藥股份有限公司淡水廠 新北市淡水區埤島里行忠路120號

藥商

中生生技製藥股份有限公司淡水廠 新北市淡水區埤島里行忠路120號