



強力施美藥膏

C.B. Ointment "Strong"

內衛藥製字 第 004550 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2025-02-18

作用：

- Chlorpheniramine maleate：具止癢作用。
- Lidocaine HCl：含有可暫時緩解因皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢症狀之成分。
- Methyl Salicylate、Menthol、Camphor等具有鎮痛、止癢、及清涼等作用。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每公克含有

有效成分	含量
Chlorpheniramine maleate	10mg
Lidocaine HCl	30mg
Methyl Salicylate	10mg
dl-Menthol	10mg
dl-Camphor	5mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Stearyl alcohol、Cetyl alcohol、Glycerol monostearate、Liquid petrolatum、Tween 60、Span 60、Propylene glycol、Hexachlorophene、Water purified

2 用途(適應症)

暫時緩解尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

3 使用上注意事項


3.1 有下列情形者，請勿使用

- (一)曾因本藥成分引起過敏。
- (二)曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏現象者。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- (一)3歲以下。
- (二)有深部皮膚組織感染。
- (三)懷孕20週以上之孕婦。(請參見【警語】)

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- 
- (一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二)要使用於臉部。
 - (三)2歲以下兒童。
 - (四)懷孕未滿20週之孕婦及可能懷孕婦女。(請參見【警語】)

3.4 其他使用上注意事項

- (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (二)避免陽光直射。
- (三)勿超過建議使用量或使用次數。
- (四)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
- (五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- (六)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
- (七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
- (八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
- (九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- (十)請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
- (十一)本藥不可連續使用超過7天。
- (十二)不得大量使用，以避免全身性吸收，曾有致死報告。
- (十三)避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。
- (十四)不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。

4 用法用量

需要時使用	適量塗抹/塗擦於患部
-------	------------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生


身體部位	副作用
皮膚	局部灼熱、刺痛、過敏性反應、紅斑、搔癢、刺痛感。
其他	水楊酸效應（耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等）

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- (一)若有上述外之其他不適情況產生。
- (二)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

5.3 非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能會影響懷孕和/或胚胎/胎兒發育。

用於懷孕30週以上之孕婦可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓；用於懷孕20週以上之



孕婦可能導致胎兒腎臟功能不全、羊水過少，甚至新生兒腎臟損傷；在懷孕早期使用則可能提高流產、心臟畸形之風險，故請遵循以下建議：

- 懷孕30週以上之孕婦，應避免使用。
- 懷孕20至30週之孕婦，用藥前須經醫師確認有使用必要，並以最低有效劑量及最短期間治療；若治療時間超過48小時，可能需要以超音波監測羊水狀態。
- 懷孕未滿20週之孕婦及可能懷孕婦女，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。

6 包裝

1000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

7 儲存方式

於25°C以下保存，並置於孩童無法觸及之處。

製造廠

中國化學製藥股份有限公司新豐工廠

新竹縣新豐鄉坑子口182之1號

藥商

中國化學製藥股份有限公司新豐工廠

新竹縣新豐鄉坑子口182之1號