



可立信凝膠10毫克/公克

KOLINCIN GEL 10MG/G

衛署藥製字 第 045186 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-05-28

1 性狀

Clindamycin Phosphate 在體外無作用，但在身體內立即分解成具有抗菌活性之Clindamycin。Clindamycin已被證實對面皰、青春痘有效，有面皰的人，使用本劑四星期後，其面皰的Clindamycin濃度達597µg/mg，在體外Clindamycin對引起面皰的粉刺出油酸桿菌(Propionibacterium acnes)之最低抑菌濃度(MIC)僅4µg/mg。使用Clindamycin後皮膚表面的游離脂肪酸由14%減至2%。

1.1 有效成分及含量

每公克含凝膠含10毫克的Clindamycin (as Phosphate)。

1.2 賦形劑

【原味】Carbomer 940, Propylene Glycol, Edetate disodium, Sodium Hydroxide, Purified Water

【玫瑰】Carbomer 940, Propylene Glycol, Edetate disodium, Rose Perfume, Sodium Hydroxide, Purified Water

【花香】Carbomer 940, Propylene Glycol, Edetate disodium, Flower Perfume, Sodium Hydroxide, Purified Water

【蘆薈】Carbomer 940, Propylene Glycol, Edetate disodium, Aloe Vera, Sodium Hydroxide, Purified Water

【薰衣草】Carbomer 940, Propylene Glycol, Edetate disodium, Lavender, Sodium Hydroxide, Purified Water

【茶樹】Carbomer 940, Propylene Glycol, Edetate disodium, Tea Tree Oil, Sodium Hydroxide, Purified Water

1.3 劑型

凝膠劑

1.4 藥品外觀

透明無色之凝膠

2 適應症

尋常性痤瘡。

3 用法及用量

3.1 用法用量

每日2次，薄敷於患部。

4 禁忌

對 Clindamycin 或 Lincomycin 有過敏歷史者、有區域性腸炎或潰瘍性結腸炎病歷、或有抗生素相關結腸炎病歷病人，請勿使用本劑。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

口服或注射 Clindamycin 可能會有嚴重的結腸炎，局部使用也可能會從皮膚吸收而有下痢、下血痢及結腸炎。如有因 *Clostridium difficile* 引起的偽膜性結腸炎，可用 Vancomycin 治療，通常是每天 500mg 至 2g，分 3-4 次服用 7-10 天。Kolinicin Gel 含有醇基劑，會引起眼灼燒感與刺激；若意外接觸敏感的表體(眼、擦傷的皮膚、黏膜)，則以大量自來水沖洗。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

妊娠：致畸胎作用

使用 100-600mg/kg/day 範圍之 Clindamycin 皮下劑量，於大鼠及小鼠進行生殖研究，並無任何生育力受損或危及胎兒的證據。至今尚未有充分的對照的懷孕婦女的報告，除非有明確的需求，懷孕期間不可使用本劑。

6.2 哺乳

病人用藥期間不可哺乳。

6.4 小兒

用於 12 歲以下兒童之安全性尚未建立。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

皮膚乾燥、接觸性皮膚炎、刺激(如紅疹、鱗屑剝落與灼熱感)、皮膚油膩、革蘭氏陰性毛囊炎、腹痛、腸胃不適。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

113.05.28

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

100公克以下鋁管裝、塑膠罐裝、450公克、1000公克塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

請貯存於25°C以下。

製造廠

中生生技製藥股份有限公司淡水廠 新北市淡水區埤島里行忠路120號

藥商

中生生技製藥股份有限公司淡水廠 新北市淡水區埤島里行忠路120號