

得膚寶軟膏劑

DAIVOBET OINTMENT

衛署藥輸字 第 023936 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-03-07

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每公克含有：主成分 Calcipotriol 50µg (as hydrate), Betamethasone 0.5mg (as dipropionate)。

1.2 賦形劑

Liquid paraffin (contains all-rac-α-tocopherol as an antioxidant), Polyoxypropylene stearyl ether (contains butylhydroxytoluene (E321) as an antioxidant), All-rac-α-tocopherol, White soft paraffin (contains all-rac-α-tocopherol as an antioxidant)。

1.3 劑型

軟膏劑。

1.4 藥品外觀

軟膏是灰白色到黃色。

2 適應症

尋常性牛皮癬。

3 用法及用量

3.1 用法用量

Daivobet®每天一次塗抹於患處，建議治療期間為四週。

曾有長達52週Daivobet®重複療程的用藥經驗。若需要在4週後持續或再度開始治療，應在進行醫療評估後且在接受定期醫療監測的情況下持續治療。

使用含calcipotriol藥物時，每日最大劑量不得超過15 g，且每週最大劑量不得超過100g。

使用含calcipotriol藥品的身體面積不得超過30%。

給藥方法

Daivobet軟膏應使用於患部。為了達到理想療效，不建議在使用Daivobet軟膏後立即淋浴或盆浴。

3.3 特殊族群用法用量

小兒

尚未建立Daivobet®軟膏使用於未滿18歲兒童的安全性與療效。

現有關於年齡12至17歲兒童的資料請參閱不良作用與藥效學特性章節，但無法提出建議劑量。

肝功能不全

尚未評估Daivobet[®]軟膏使用於嚴重肝功能異常病人的安全性與療效。

腎功不全

尚未評估Daivobet[®]軟膏使用於嚴重腎功能衰竭病人的安全性與療效。

4 禁忌

對主成份或任何賦形劑過敏者。

因於含有calcipotriol，Daivobet 禁用於已知鈣代謝失調的病人。由於含有皮質類固醇，Daivobet 禁用於下列情況：皮膚之病毒性損傷(如疱疹或水痘)，皮膚之黴菌或細菌感染、寄生蟲感染、肺結核或梅毒相關之皮膚表現、酒糟鼻、唇邊皮膚炎、尋常性痤瘡、皮膚萎縮、萎縮性橫紋、皮膚靜脈脆弱、魚鱗癬、酒渣鼻、潰瘍、傷口、肛門和生殖器搔癢症。

Daivobet 禁用於點狀、紅皮性、脫落性、膿皰型之乾癬。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

對於內分泌系統的作用：

和使用全身性類固醇治療有關的副作用，如腎上皮質素的抑制或影響糖尿病的代謝調控，亦見於外用類固醇治療，此乃由於全身性吸收的緣故。應避免大面積使用於受損皮膚、密閉性療法、黏膜、皮膚皺摺處，否則會增加類固醇的全身性吸收。

在同時患有廣泛性頭皮乾癬與廣泛性身體乾癬的病人合併接受高劑量Xamiol 凝膠(使用於頭皮)與高劑量Daivobet 軟膏(使用於身體)的一項試驗中，治療4週後，32名病人中有5名在對於促腎上腺皮質激素(ACTH)刺激的皮質醇反應方面表現出臨界值降低。

對於鈣代謝的作用：

由於含有calcipotriol，超過每週最大劑量(100 g)時可能發生高血鈣症。血清鈣濃度會在停止治療後恢復正常。在遵照關於使用calcipotriol的建議時，高血鈣症之風險極小。

局部不良反應：

Daivobet 含有強效第III類類固醇，必須避免於相同治療部位合併進行其他類固醇治療。由於臉部皮膚及生殖器對於皮質類固醇非常敏感。本藥不得使用於這些部位。必須指示病人正確使用藥品，避免使用於或意外接觸臉部、口腔與眼部。每次用藥後必須清洗雙手，避免意外接觸這些部位。

併發性皮膚感染：

當皮膚受損狀況變成績發性感染時，則應以抗菌藥物治療。若感染情況惡化則應停止皮質類固醇的治療。

停止治療：

使用外用皮質類固醇治療時，一旦停藥，可能會有泛發性膿疱牛皮癬或反彈(rebound)作用的風險存在。治療後期間之醫療監測是必要的。

長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作(局部類固醇戒斷反應)。

嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位。其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別是使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品。請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

長期使用：

長期使用時，可能會增加局部或全身性皮質類固醇副作用的風險。

未評估的使用方式：

Daivobet 未有使用於滴狀乾癬的經驗。

合併治療與UV暴露：

適用於身體乾癬病灶的Daivobet 軟膏曾與適用於頭皮乾癬病灶的Xamiol 凝膠合併使用，不過，目前Daivobet 合併其他局部乾癬藥物使用於相同治療部位、合併其他全身性乾癬藥物或合併光治療的經驗有限。

使用Daivobet 治療期間，建議醫師告知病人限制或避免過度曝露於自然或人工日光下。唯有在醫師及病人評估其效益大於風險時，外用皮質類固醇才能與紫外幅射一起使用。

對於賦形劑的不良反應：

Daivobet 含有butylhydroxytoluene (E321)，可能會造成局部皮膚反應(如接觸性皮炎)或是對眼睛或黏膜造成刺激。

5.3 操作機械能力

Daivobet 不會或幾乎不會影響駕駛與操作機械的能力。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

目前未有關於Daivobet 使用於懷孕女性的充分資料。糖皮質固醇在動物試驗已顯示具有生殖毒性，但是多項流行病學試驗(未滿300例懷孕結果)未顯示女性於懷孕期間接受皮質類固醇治療後生下的嬰兒會表現出先天異常。目前對於人體的可能風險尚不確定。因此，在懷孕期間，Daivobet 僅應使用於潛在利益高於潛在風險之情況。

6.2 哺乳

Betamethasone會進入乳汁，但對於嬰兒似乎不會引起治療劑量的不良作用風險。目前未有calcipotriol分泌至乳汁的資料。

Daivobet

應謹慎使用於正在哺乳的女性。應指示病人正在哺乳時不得將Dovobet 使用於乳房。

6.3 有生育能力的女性與男性

在大鼠口服calcipotriol或betamethasone dipropionate的試驗中，未顯示對於雄性或雌性動物的生殖力造成損害。

7 交互作用

Daivobet 尚未進行關於交互作用的試驗。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

依據包括上市後安全性試驗與自主通報的臨床試驗資料匯集分析，估計不良反應發生率。

治療期間最常通報發生的不良反應為各種皮膚反應(如搔癢)與脫皮。

曾通報發生膿皰型乾癬與高血鈣症。

依據MedDRA SOC列出不良反應，個別不良反應以通報發生率最高者開始依序列出。在各發生率群組中，依嚴重程度遞減的順序列出不良反應。

極常見($\geq 1/10$)

常見 ($\geq 1/100$ 至 $< 1/10$)

不常見($\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$)

罕見($\geq 1/10,000$ 至 $< 1/1,000$)

極罕見($< 1/10,000$)

感染與寄生蟲	
不常見 $\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$	皮膚感染* 毛囊炎
罕見 $\geq 1/10,000$ 至 $< 1/1,000$	癬
免疫系統疾病	
罕見 $\geq 1/10,000$ 至 $< 1/1,000$	過敏
代謝與營養疾病	
罕見 $\geq 1/10,000$ 至 $< 1/1,000$	高血鈣症
皮膚與皮下組織疾病	
常見 ($\geq 1/100$ 至 $< 1/10$)	脫皮 搔癢
不常見($\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$)	皮膚萎縮 牛皮癬惡化 皮膚炎

	發紅 皮疹** 紫斑或瘀斑 皮膚灼熱感 皮膚刺激感
罕見 $\geq 1/10,000$ 至 $1 < 1/1,000$	膿皰型乾癬 皮膚紋 光敏感反應 瘡瘡 皮膚乾燥
全身疾患與給藥部位症狀	
不常見 ($\geq 1/1,000$ 至 $< 1/100$)	給藥部位色素變化 給藥部位疼痛***
罕見 $\geq 1/10,000$ 至 $1 < 1/1,000$	反彈作用

*曾通報發生皮膚感染，包括細菌性、黴菌性與病毒性皮膚感染。

**曾通報發生多種類型的皮疹反應，例如脫皮性皮疹、丘疹與膿皰疹。

***給藥部位灼熱感包含於給藥部位疼痛中

皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅、可能會蔓延超出初始治療區域、灼熱或刺痛感、搔癢、皮膚脫屑、滲膿。

兒童族群：

在一項未對照開放性試驗中，有33名年齡12-17歲的尋常性乾癬青少年接受Daivobet 軟膏最高劑量每週56g的治療共4週。未觀察到新的不良事件，也未發現關於全身性皮質類固醇作用的疑慮。然而，本試驗的規模不足以針對Daivobet 軟膏使用於兒童與青少年的安全性做出確切結論。

已個別觀察到calcipotriol及betamethasone藥理分類相關的不良反應：Calcipotriol：副作用包括塗抹患部反應、搔癢、皮膚刺激、皮膚灼熱感或刺痛、皮膚乾、紅斑、皮疹、皮膚炎、濕疹、牛皮癬惡化、光敏感反應及過敏反應包括少數發生的血管性水腫和臉部水腫。罕見外用後造成之全身性作用，如高血鈣或尿鈣過多。

Betamethasone (as dipropionate)

特別是在延長使用塗抹後造成之局部反應包括，皮膚老化、毛細血管擴張、紋、毛囊炎、毛髮過多、唇邊皮膚炎、接觸性過敏皮膚炎、淡化作用及膠質粟粒疹。當治療牛皮癬時可能會有泛發性膿皰牛皮癬的風險存在。罕見成人使用外用皮質類固醇產生全身性作用，不過，也有可能是嚴重的。特別是在長期治療後可能會發生腎上腺皮質抑制、白內障、影響或增加眼壓。當塗抹於閉合部位(柔軟部位、皮膚皺摺處)、大面積塗抹及長期治療較常會發

生全身性副作用。

9 過量

使用超過建議劑量可能會引起血清鈣濃度升高，此作用會在停止治療時減退。高血鈣的症狀包括多尿、便秘、肌肉無力、意識混淆與昏迷。

過度長期使用局部皮質類固醇可能抑制腦垂腺-腎上腺功能，進而引起通常為可逆性的繼發性腎上腺功能不足。在此種情況下，可進行症狀性治療。

發生慢性毒性時，必須漸進地停用皮質類固醇治療。

曾有報告指出，一名廣泛性紅皮性乾癬病人誤用Daivobet 軟膏每週240 g（相當於每日劑量約34 g）共5個月（最大建議劑量為每日15 g），於治療期間發生庫欣氏症候群，隨後在突然停止治療後發生膿皰型乾癬。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Calcipotriol是維生素D的衍生物，體外研究資料顯示其可分化與抑制角質細胞的增生，為治療牛皮癬有效的依據。

10.2 藥效藥理特性

如同其他局部皮質類固醇，betamethasone dipropionate具有抗發炎、止癢、血管收縮與免疫抑制作用，但無法治癒潛在病症。透過包覆可增加角質層滲透而提高藥效；但不良事件發生率會因而增加。局部性類固醇的抗發炎活性機轉尚不清楚。

10.3 臨床前安全性資料

皮質類固醇在動物的研究結果顯示生殖毒性(裂脰、骨骼畸形)。在長期餵食皮質類固醇之老鼠的生殖毒性研究中，發現延長懷孕時間，分娩時間增長且困難。此外，也發現了後代存活率及體重減少和體重增加情形。生育能力沒有受損。上述生殖毒性和人類的關聯性仍不得而知。

一項關於calcipotriol皮膚致癌性的小鼠試驗與一項口服致癌性的大鼠試驗均未顯示對於人體有特別風險。小鼠光致癌性試驗顯示，calcipotriol可能增強紫外線輻射(UVR)誘發皮膚腫瘤的作用。

一項關於皮膚致癌性的小鼠試驗與一項口服致癌性的大鼠試驗均未顯示betamethasone dipropionate對於人體有特別的危害風險。尚未進行關於betamethasone dipropionate光致癌性的試驗。

11 藥物動力學特性

Calcipotriol和Betamethasone在人體經皮吸收的量分別小於採用劑量的1%，在正常情況下使用，全身性吸收並不預期會對全身性參數有任何影響。此兩種主成份的藥物動力學性質亦不會互相影響。

12 臨床試驗資料

曾有一項634名乾癬病人的安全性試驗研究了Daivobet®軟膏的重複療程(依需要每日一次，單獨或交叉給予Daivonex®)長達52週，與在Daivobet®軟膏的初步療程後單獨使用Daivonex® 48週的比較。Daivobet®軟膏組有21.7%的病人通報發生不良藥物反應，Daivobet®軟膏/ Daivonex®交叉組

為29.6%，而Daivonex[®]組為37.9%。Daivobet[®]軟膏組超過2%病人通報發生的不良藥物反應為搔癢(5.8%)與乾癬(5.3%)。Daivobet[®]軟膏組有4.8%的病人通報發生可能與長期使用皮質類固醇相關的不良事件(例如：皮膚萎縮、毛囊炎、退色、癬與紫斑)，Daivobet[®]軟膏/Daivonex[®]交叉組為2.8%，Daivonex[®]組為2.9%。

Daivobet[®]凝膠與Daivobet[®]軟膏合併使用最高至每週106 g後，針對同時人有廣泛性頭皮乾癬與身體乾癬的病人評估血清皮質醇濃度，以確認對於ACTH的腎上腺反應。在治療4週後，32名病人中有5名(15.6%)在ACTH刺激後30分鐘觀察到皮質醇反應的臨界值降低，而在持續治療至8週的11名病人中則觀察到2名(18.2%)。所有病例在ACTH刺激後60分鐘的血清皮質醇濃度均表現正常。未有證據顯示這些病人表現出鈣代謝的變化。因此，在HPA抑制方面，本試驗有一些證據顯示極高劑量Daivobet[®]凝膠與軟膏對於HPA軸可能有微弱作用。

兒童族群

在一項未對照的4週試驗中，33名年齡12-17歲人有身體乾癬的青少年最高每週使用Daivobet[®]軟膏56 g，並測量對於ACTH刺激的腎上腺反應。未有病例通報發生HPA軸抑制。未通報發生高血鈣症，但一名病人發生可能為治療相關的尿中鈣濃度升高。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1,000 公克以下金屬軟管裝。

13.2 效期

二年。

13.3 儲存條件

30°C以下儲存。

13.4 儲存注意事項

開封後可使用12個月。

15 其他

內文依據修訂日期：2016.05

TW-PI-202311

製造廠

國外許可證持有者：LEO PHARMA
A/S

地址：55 INDUSTRIPARKEN DK-2750 BALLERUP DENMARK

製造廠名稱：LEO LABORATORIES
LIMITED

製造廠地址：285 CASHEL ROAD, CRUMLIN, DUBLIN 12,
IRELAND

藥商

禾利行股份有限公司

台北市松山區敦化北路311號3樓