


Cephalosporin 系抗生素

榮富多信 膠囊500毫克 (西華卓西)**Lonfadroxil Capsules 500 mg**

本品之主成分Cefadroxil monohydrate，此抗生素原料為Bristol研究開發，從Cefalexin monohydrate改良而得，其抗菌作用及臨床效果均優於其他口服Cephalosporin系製劑，約為Cephalexin之二倍，口服其血中濃度為Cephalexin的1.4倍，藥效持久性，為Cephalexin之1.3倍，在小腸中吸收速度快，受食物影響比Cephalexin少，抗菌活性比Cephalexin強，尿中濃度比Cephalexin高，且停留時間久，治療生殖泌尿系感染比Cephalexin效果好，對G(+)，E. Coli Streptococcus pyogenes，Klebsiella species，抗菌活性比Cephalexin強。

【主成分性狀】

本品之主成分Cefadroxil · H₂O為白色至乳白色粉末，具特殊臭，微溶於水，幾乎不溶於氯仿及乙醚。構造式：



分子式：C₁₆H₁₇N₃O₅S · H₂O

分子量：381.39

【成 分】

Each capsule contains：

Cefadroxil monohydrate 524.8 mg

eq. to Cefadroxil 500 mg (potency)

【賦形劑】

Lactose、Magnesium Stearate、Croscarmellose Sodium

【膠囊成分】

Gelatin、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine

【藥效動力學特點】

- 1.口服吸收迅速，在血中有效濃度持續12小時以上，其Area under serum curve遠超過其他Cephalosporin類抗生素。
- 2.本劑不易受食物干擾，可與食物併用，以降低本劑對胃腸刺激。
- 3.抗菌範圍廣：對Streptococcus pneumoniae，Streptococcus pyogenes，Escherichia coli，Klebsiella species，Penicillin sensitive，resistant Staphylococcus aureus等抗菌活性強。

【作 用】

呼吸道感染症(扁桃腺炎、咽喉炎)、皮膚軟組織感染症、生殖泌尿道感染症(急性膀胱炎)、婦產科感染症、耳鼻喉科感染症。

【適應症】

革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之感染症。

【用法用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人：通常一次250mg至500mg，一日三至四次，對有生命威脅之感染症。可增加劑量或用藥次數。

兒童：每日每公斤體重25mg至50mg，分次給與，極嚴重感染，可增至每日每公斤體重75mg至100mg。

【不良反應】

嚴重的皮膚不良反應，如多型性紅斑、史蒂文生氏-強生症候群 (Stevens-Johnson syndrome) /毒性表皮性壞死溶解症 (toxic epidermal necrolysis)。

【注意事項】

- 1.曾對Penicillin系抗生素產生過敏之患者，使用Cephalosporin系抗生素應注意，因由臨床實驗證明Cephalosporin系與Penicillin系互具交叉過敏症，即曾對其中任一系有過敏之患者，會對Penicillin系及Cephalosporin系均產生過敏，故曾對Cephalosporin系或Penicillin系抗生素產生過敏者，禁用本劑。
- 2.特異體質者，使用本劑應注意，若產生過敏反應時，立刻停藥，並給予適當的治療(給pressor amines，corticosteroids antihistamines等)。
- 3.腎功能不全之患者(Creatinine clearance rate在50ml./min.以下)使用本劑宜慎重，服用期間，常做腎功能檢查，並視病情調整劑量。
- 4.本劑對孕婦、授乳婦之安全報告尚未確立。使用本劑宜謹慎。
- 5.藥物相互作用：
 - a.與Probenecid合用，會降低本劑之排泄，使本劑血中濃度上升，毒性增高。
 - b.干擾診斷結果：

使用本劑會使Alkaline phosphatase levels，SGOT levels，SGPT levels上升，產生false-positive Coombs reaction。
- 6.使用本劑副作用少，長期服用，偶有下痢、嘔吐、胃痙攣等消化道不適，或皮膚癢、紅、發疹等過敏反應。或由於黴菌過度生長。產生口、舌痛時，宜做適當治療。
- 7.對於早產兒，新生兒之臨床報告有限，使用本劑宜謹慎。

【儲存條件】

請儲存於25℃以下。

【包 裝】

100、500、1000粒瓶裝、100粒盒裝。

委託者：

新瑞生物科技股份有限公司

台南市新市區中山路182號

製造廠：

瑞士藥廠股份有限公司新市廠

台南市新市區中山路182號