



“信東” 信保欣 膠囊250毫克

Cephalexin Capsules 250mg "TBC"

衛署藥製字 第 006747 號

須由醫師處方使用

版本日期 2023-11-15

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each Capsule Contains : Cephalexin.....250mg (Potency)

1.2 賦形劑

Magnesium Stearate、Capsule Shell(含Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine)。

1.3 劑型

膠囊劑

1.4 藥品外觀

2號膠囊，綠色/白色，標記ST006

2 適應症

有感受性細菌所引起之泌尿生殖道、呼吸道、柔組織及皮膚等感染症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

口服：成人一次250mg，每6小時一次。

小孩一天25~50mg/kg，分四次服用。

3.2 調製方式

目前尚無資訊。

3.3 特殊族群用法用量

目前尚無資訊。


4 禁忌

目前尚無資訊。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

- 曾對Cephalosporin系製劑有過敏反應之患者不可使用本劑。
- 有下列情形之患者宜謹慎使用。
 - 對penicillin製劑有過敏反應之患者。
 - 易引起支氣管喘息、發疹、蕁麻疹等過敏現象體質之患者。



- 高度之腎機能障害患者。

- 服用本劑後倘有口內異常感覺、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、發汗、發疹、蕁麻疹、紅斑、搔癢、發熱、淋巴腺腫脹、關節痛等症狀出現時，應即中止使用而改以其他藥劑（如：Pressor amines、Corticosteroids and/or Antihistamines）治療。
- 服用本劑偶有食慾不振、噁心、嘔吐、下痢、軟便、胃部不快之胃腸症狀出現。
- 臨床上曾有性器、肛門搔癢症、膇炎、嗜酸性白血球增多、嗜中性白血球減少及SGOT、SGPT輕度上昇之報告。
- 服用本劑後，可能有假性糖尿反應，可用Clinistix試劑則不生此現象。

5.2 藥物濫用及依賴性

目前尚無資訊。

5.3 操作機械能力

目前尚無資訊。

5.4 實驗室檢測

目前尚無資訊。

5.5 其他注意事項

目前尚無資訊。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

目前尚無資訊。

6.2 哺乳

目前尚無資訊。

6.3 有生育能力的女性與男性

目前尚無資訊。

6.4 小兒

目前尚無資訊。

6.5 老年人

目前尚無資訊。

6.6 肝功能不全

目前尚無資訊。

6.7 腎功能不全

目前尚無資訊。

6.8 其他族群

目前尚無資訊。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

8.3 上市後經驗

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

8~1,000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

儲存於25°C以下，緊密容器。


13.4 儲存注意事項

目前尚無資訊。

14 病人使用須知

目前尚無資訊。

Cephalexin是由頭孢子菌素 (Cephalosporin C) 衍生而來之半合成抗生素，其構造為8元之 β -lactam-dihydrothiazine Ring為骨架，異於Penicillin 7元之 β -lactam-thiazolidine Ring構造式如下：



Cephalexin為單結晶水之白色晶形粉末，其作用機序類似Penicillin之抑制細菌細胞壁之Mucopolysaccharide合成，Penicillinase不影響其作用，是廣效性之抗生素，不受酸之作用，口服易吸收。血中濃度（口服250 mg）可達4.5~6.8mcg/ml分佈很廣，如體液、肺、脾、肝、胰臟、心臟、胃壁、腹膜、盲腸、膽囊、陰道、腎臟等。口服後約90%不改變分子型式由尿中排出體外。對Gram（+），Gram（-）菌，如化膿性鏈球菌、肺炎雙球菌、白喉桿菌、草綠色鏈球菌、大腸菌、肺炎克雷白氏菌、奇異變形桿菌、流行性感嗜血桿菌、淋病雙球菌、腦膜炎雙球菌、沙門氏族菌及志賀氏菌屬等皆有效。



製造廠

信東生技股份有限公司觀音廠

桃園市觀音區樹林村國建一路1號

112.11.15

藥商

信東生技股份有限公司

桃園市桃園區介壽路 2 2 號