



華興製藥

四環素類抗生素

“華興” 美力欣 膠囊 50公絲
(美諾四環素)

Melicin Capsules 50mg “H.S.”
(Minocycline)

衛署藥製字第038761號(G-4756)

〔簡 介〕

本品為半合成的四環素，口服幾乎完全吸收，脂溶性高，而且具有很長的半衰期(24小時)，作用機序為阻細菌的蛋白質合成而發揮抗菌作用，並且使用於對四環素具抗藥性的菌株，如葡萄球菌、鏈球菌、大腸桿菌等仍然有效是其特點。

〔成 分〕

每粒膠囊含：Minocycline(as Hydrochloride).....50mg(Potency)

〔賦 形 劑〕

Starch、Colloid Silicon Dioxide、Magnesium Stearate、Talc

Capsule shell: Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Tartrazine、Sunset Yellow FCF、New Coccin、Purified Water

〔適 應 症〕

革蘭氏陽性菌及陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒所引起之感染症。

〔用法用量〕

第一次投與2~4粒，以後每12~24小時2粒。

本藥須由醫師處方使用。

〔注意事項〕

1. 偶有眩暈感出現，投與中患者從事汽車的駕駛，危險的機械操作及高處作業時應注意。
2. 對以下患者慎重投與：肝、腎功能不全患者，食道通過障礙患者、高齡者、全身狀態不良患者。
3. 對新生兒、乳、幼、小兒、授乳婦的投與：會引起幼兒牙齒變色、琺瑯質形成不全、骨發育不全，限其他藥劑無效時才考慮使用。
4. 對妊娠婦的投與：動物實驗有胎兒毒性，會引起胎兒牙齒變色、琺瑯質形成不全、骨發育不全，考慮治療上的效益和風險再使用。
5. 併用鈣、鎂、鋁和鐵劑，會降低吸收減弱效果。
6. 會抑制血漿抗凝血酶活性，併用抗凝血劑時應注意。
7. 給藥時應給予大量水吞服，以避免膠囊停留在食道溶解主成分釋出，造成食道局部刺激與潰瘍。
8. 避免與其他類抗生素併用。
9. 避免使用超過效期之四環素類抗生素，以免其分解物質造成之高腎毒性。
10. 本劑應置於乾燥陰涼處。
11. 本劑應置於小孩伸手不及處。

〔禁 忌〕

對四環素類抗生素過敏的既往歷患者禁用本劑。

〔副 作 用〕

1. 休克：極少會引起休克，偶有不舒服、口內異常感、喘鳴、便意、耳鳴現象時停藥即可改善。
2. 過敏：少有發熱、發疹、蕁麻疹、光線過敏症、浮腫(四肢、顏面)等現象。
3. 皮膚：長期投與有引起皮膚、粘膜、色素沈著現象。
4. 中樞神經系統：偶有眩暈感。
5. 肝臟：少有GOT、GPT上昇現象，大量投與可能引起肝功能障礙。
6. 消化器：偶有食慾不振、噁心、嘔吐、腹痛、下痢、口內炎、舌炎、肛門周圍炎現象。
7. 血液：少有血小板減少、顆粒性白血球減少、嗜酸性白血球增多現象。
8. 出現新感染症時，應即停藥，並對新感染症治療。
9. 維他命欠缺症：少有維他命K、維他命B群欠缺症狀。
10. 顱內壓上昇：少有嘔吐、頭痛、複視、乳頭狀水腫、囟門凸起等症狀，若有則停藥。
11. 其他：偶會出現頭重、倦怠感。

〔儲 存〕

儲存於25℃以下。

〔包 裝〕

8~1000粒瓶裝及鋁箔盒裝。

本品代號：Melicin 159

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷128號

服務專線：(04) 8832121~6