

"十全"易伏炎膜衣錠 400 毫克 (異布洛芬)

EBUFEN F.C.TABLETS 400MG "S.C"

衛署藥製字 第 040575 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-06-12

心血管栓塞事件：

1. NSAIDs藥品會增加發生嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。此風險可能發生在使用該類藥品的初期，且使用藥品時間越長，風險越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG) 之後14天內禁用本藥。

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Ibuprofen.....400 mg

1.2 賦形劑

Corn Starch, Lactose Anhydrous, Hydroxypropyl Cellulose, Pregelatinized Starch, Silicon Dioxide, Sodium Starch Glycolate, Talc, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Polyethylene Glycol 6000, Titanium Dioxide, Tartrazine Aluminum Lake, Sunset Yellow No.5 Aluminum Lake, Plasdone.

1.3 劑型

膜衣錠

1.4 藥品外觀

圓形橘色膜衣錠

2 適應症

下列疾患及症狀之消炎鎮痛：慢性風濕關節炎、關節痛、關節炎、神經痛、神經炎、背腰痛、手術及外傷後之消炎、鎮痛。

3 用法及用量


3.1 用法用量

本藥須由醫師處方使用。

通常1天量為0.9-2.4公克，分次服用，對某些患者以1天0.6-1.2公克的維持量即予奏效。如有胃腸障礙，可以食物或牛奶伴服，兒童劑量1天20 mg/kg分次服用，30公斤以下兒童1天最大量為500 mg。每日最大劑量不建議大於2400 mg。

4 禁忌

1. 對Ibuprofen過敏之患者。
2. 活性消化性潰瘍、出血或穿孔患者；具NSAIDs相關腸胃道出血或穿孔病史者。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史者。
3. 嚴重出血傾向之患者。

- 
4. 嚴重肝衰竭。
 5. 嚴重腎衰竭。
 6. 服用Aspirin或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹或其他過敏反應者。此類病人曾有嚴重(極少數為致死性)類過敏反應(anaphylactic-like reaction)發生之報告。
 7. 進行冠狀動脈繞道手術(Coronary artery bypass graft, CABG)之後14天內禁用本藥。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

1. 使用消炎鎮痛劑治療乃為對症療法，而非原因療法。
2. 用於治療慢性疾患時應考慮下列事項：
 - 2.1 長期投與時，須定期作臨床檢查(尿液檢查、血液檢查及肝機能檢查)，如發現有異常現象，則須採取減量或停藥等適當措施。
 - 2.2 考慮採用非藥物性療法。
3. 用於治療急性疾患時，應考慮下列事項：
 - 3.1 對於急性炎症，須考慮其病痛及發熱程度而給藥。
 - 3.2 原則上應避免長期使用同一類藥品。
 - 3.3 如有原因療法，則應採用。
4. 本藥可能會遮蔽感染症狀之顯現，因此用於治療感染所引起之炎症時，合併使用適當之抗菌劑，同時仔細觀察，慎重投與。
5. 盡量避免與其他消炎鎮痛劑合併使用。
6. 對小兒及高齡患者，尤其注意有否復作用出現，並以最低之有效劑量來慎重投與。
7. 懷孕 30 週以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥 (NSAIDs)可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓，應避免使用。懷孕 20 週或以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥 (NSAIDs)可能導致胎兒腎臟功能不全 (fetal renal dysfunction)、羊水過少 (oligohydramnios)，甚至新生兒腎臟損傷 (renal impairment)。若醫療專業人員認為病人有必要於孕期 20 至 30 週時使用非類固醇抗發炎藥，則應限制以最低有效劑量及最短期間治療。若治療時間超過 48 小時，醫療專業人員應考慮使用超音波監測羊水狀態。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

抑制前列腺素合成可能會影響懷孕和/或胚胎/胎兒發育。部分流行病學研究數據顯示，在懷孕早期使用前列腺素合成酶抑制劑會提高流產、心臟畸形之風險。動物實驗已證實使用前列腺素合成酶抑制劑會導致著床前/後胚胎損失率及胚胎/胎兒致死率增加；此外，曾有動物實驗報告指出，於器官形成期使用前列腺素合成酶抑制劑之動物，其胚胎畸形(包括心血管畸形)之發生率增加。


7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

1. 可能會引起再生不良性貧血、顆粒球缺乏症、血小板減少等血液傷害，故須做血液檢查並小心觀察，如有異常狀況出現，必須立刻停藥。

- 
2. 有時可能會產生Stevens-Johnson症候群，發疹或誘發氣喘等症狀，遇有此等過敏症狀出現時，必須立刻停藥。
 3. 如有視力模糊或出現重聽及耳鳴現象時，應慎重投與。
 4. 可能出現黃疸及氨基轉移酶值異常等現象。
 5. 可能會引起胃腸出血，遇有此現象，必須立刻停藥，有時會有食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛、下痢、胃部不快感等現象，或出現口內炎、便秘等症狀。
 6. 有時會出現頭痛、暈眩及抑鬱等症狀。
 7. 對孕婦及授乳婦之安全性尚未確立，除非有醫師指示，最好不要投與。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

本品能抑制前列腺素的合成，還會減少微血管的通透性和多形核白血球的運動。對於Rat之Adjuvant關節炎，以後肢強打法，顯示對於炎症以及浮腫具有抑制之效果。

以Randall-Selitto法依據藥理試驗對於正常肢與炎症肢之比較，其鎮痛效果尤其對炎症肢特別奏效，此乃本劑之鎮痛效果係以末梢性之鎮痛效果為主體，而兼具中樞性鎮痛效果之故。本品口服吸收迅速，排泄亦快，半衰期約2小時，投藥後24小時內，70%的Ibuprofen則以代謝物經尿液排泄。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

1. 心血管栓塞事件：

依據多項COX-2選擇性抑制劑及非選擇性NSAIDs之臨床試驗研究，發現使用該類藥品達三年，會增加嚴重心血管栓塞事件之風險，包括心肌梗塞和中風，且可能為致命的。惟依目前現有研究數據，無法證實各種NSAIDs藥品是否具有相似之心血管栓塞事件風險。且無論病人有無心血管疾病或相關危險因子，發生嚴重心血管栓塞事件之相對風險，具有相似程度的增加。但是，有心血管疾病或具相關危險因子者，因本身出現心臟病發作或中風的風險即較高，故使用該類藥品後發生嚴重心血管栓塞事件之絕對風險更高。另一些觀察性研究發現，剛開始使用該類藥品的幾週內，即可能出現嚴重心血管栓塞事件，而且隨著使用劑量增加，其心血管栓塞事件之風險亦隨之增加。研究顯示小幅增加動脈栓塞事件的風險與使用ibuprofen有關，尤其是使用高劑量ibuprofen(每日用量2400毫克)。整體而言，流行病學研究並未顯示低劑量ibuprofen(每日用量小於1200毫克)與增加動脈栓塞事件的風險有關。

有心血管事件危險因子(如：高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸)的病人在開始使用ibuprofen前應謹慎評估，尤其是需要使用高劑量ibuprofen(每日用量2400毫克)。為減少該類藥品之心血管不良事件潛在風險，建議盡可能使用最短治療時間及最小有效劑量。且在用藥期間，醫療人員及病人應注意心

血管不良事件之發生，即使在先前未曾出現心血管相關不良症狀。病人需要被告知嚴重心血管不良事件之症狀以及發生時之處理方式。

2. 冠狀動脈繞道手術(CABG)後：

兩項大型臨床試驗研究顯示，於冠狀動脈繞道手術後10-14天內使用COX-2選擇性抑制劑藥品，其發生心肌梗塞及中風的情形增加。因此，進行冠狀動脈繞道手術之後14天內忌用本品。

3. 最近發生心肌梗塞的病人：

觀察性研究顯示，在心肌梗塞後使用NSAIDs藥品，在用藥第一週時，出現再梗塞、心血管相關死亡及整體死亡率等情形皆增加。研究亦顯示，心肌梗塞後使用NSAIDs者，其第一年死亡率為20/100人/年，而未使用NSAIDs者之死亡率則為12/100人/年。雖然使用NSAIDs者第一年後之死亡率逐年下降，但其後4年內之死亡率仍相對較高。

因此，應避免使用本藥品於最近曾發生心肌梗塞的病人，除非經評估使用藥品之效益大於再發生心血管栓塞事件之風險。若本藥品使用於近期發生心肌梗塞的病人，應嚴密監視是否出現心肌缺血之症狀。

4. 心臟衰竭與水腫：

隨機分派研究結果顯示，使用COX-2選擇性抑制劑及非選擇性NSAIDs藥品治療的病人發生心臟衰竭住院的比例為安慰劑組的兩倍。且在觀察性研究亦發現，有心臟衰竭的病人使用該類藥品，其心肌梗塞、因為心臟衰竭住院及死亡等情形皆增加。

有些使用NSAIDs藥品的病人被觀察到有水分滯留及水腫等情形。

因此使用本藥品可能會使一些藥品之心血管作用變得不明顯，例如diuretics、ACE inhibitors或angiotensin receptor blockers(ARBs)。

因此，應避免使用本藥品於嚴重心臟衰竭的病人，除非經評估使用之效益大於心臟衰竭惡化之風險。若本藥品使用於嚴重心臟衰竭的病人，應嚴密監視是否出現心臟衰竭惡化之症狀。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

5-1000錠塑膠瓶裝與鋁箔盒裝。

13.2 效期

請查看外包裝EXP日期。

13.3 儲存條件

25°C以下室溫保存。

製造廠

十全實業股份有限公司

南投縣南投市仁和路 2 7 號

藥商

十全實業股份有限公司

南投縣南投市仁和路 2 7 號