



"元宙"綜乙方膜衣錠

Vitamin B Complex F.C. Tablets "Y.C."

衛部藥製字 第 060234 號

須由醫師處方使用

版本日期 2025-07-02

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每膜衣錠中含有:

Thiamine disulfide 50 mg

Riboflavin 5 mg

Pyridoxine HCl 5 mg

Cyanocobalamin 0.005 mg

本藥品活性成分中含有鈣。

1.2 賦形劑

Glyceryl behenate、Microcrystalline cellulose、Lactose monohydrate、Silicon dioxide hydrated、Magnesium stearate、Butylate hydroxytoluene、Talc、Polyvinyl alcohol-part.hydrolyzed、Titanium dioxide、Ponceau 4R aluminum lake、Glycerol esters of fatty acid、Sodium lauryl sulfate、Erythrosine aluminum lake、Tartrazine aluminum lake、Sepifilm LP 770。

1.3 劑型

膜衣錠。

1.4 藥品外觀

紅色圓形膜衣錠。

2 適應症

腳氣、多發性神經炎、維生素B1缺乏症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

本劑之用法用量，服用期間，視症狀之種類、輕重而異，通常成人參照下列適應症各別之服用劑量，分1-3次服用，孩童依年齡遞減。

1.神經性疾患:神經炎、多發性神經炎、維生素B1時之代謝障礙，每日服2-3錠。神經手術之神經麻痺，每日服3錠。

2.內科疾患:腳氣及腳氣樣狀(倦怠感、心悸、浮腫)消耗性疾患之輔助療法，每日服2-3錠。

3.婦產科疾患:妊娠性多發神經炎，每日服2-3錠。

4.眼科疾患:視神經炎、球後視神經炎，每日服2-3錠。

4 禁忌

已知對維生素B12或本藥品所含之賦形劑發生嚴重過敏者。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1.服用本劑後尿會呈黃色係由本劑中含有維生素B2所引起，請勿掛慮。

5.1.2.本藥品含有鈷，若已知本身對鈷過敏，請告知醫療人員。

5.1.3.曾有鈷過敏病人使用本藥品後發生過敏性接觸皮膚炎之情形。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1.皮膚及皮下組織異常:上市後曾接獲使用本藥品後出現皮膚疹、搔癢、痤瘡樣皮疹、血管性水腫、皮膚炎、多型性紅斑等不良反應。

8.1.2.免疫系統的異常:上市後曾接獲使用本藥品後出現嚴重過敏反應或過敏性休克不良反應。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

10.2.1.吸收性佳:服用後迅速被消化管吸收，保持高血中濃度，且持續長時間。

10.2.2.迅速脂化:服用後在體內迅速被酯化，生成多量之結合型B1(co-carboxylase)提高效力。

10.2.3.不被維生素B1分解酵素(aneurinase)分解，比例服用劑量迅速被吸收。

10.2.4.主要效果:恢復肌肉之疲勞，防止體力之消耗。圓滑神經機能並發揮優良鎮痛作用，旺盛心肌代謝，促進腸管之蠕動，改善便秘等症狀。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4-1000錠，PTP鋁箔盒裝、HDPE塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

本藥應包裝於緊密容器，貯存於陰涼(25°C以下)乾燥避光且兒童不易取得處所。

製造廠

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路 2 7 2 號

藥商

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗三路272號