



“元宙”美舒樂（甲鈷胺明）膠囊 0.5 毫克 MECOMIN CAPSULES 0.5MG (MECOBALAMIN)"Y.C."

衛署藥製字 第 033453 號

須由醫師處方使用

版本日期 2025-08-06

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each capsule contains:

Mecobalamin 0.5mg

本藥品活性成分中含有鈷。

1.2 賦形劑

Starch anhydrous、Magnesium stearate、Hydroxypropyl cellulose、Silicon dioxide hydrated。

Capsule No.4:(衛署藥製字第033668號):(Gelatin、Tartrazine、Glycerin、Titanium dioxide、Sodium lauryl Sulfate、New cocine、Erythrosine、Water purified)。

Capsule No.4:(衛署藥製字第012969號):(Gelatin、Titanium dioxide、Sodium lauryl sulfate、Water purified、Sunset yellow FCF、New cocine red No.6)。

1.3 劑型

膠囊劑。

1.4 藥品外觀

橘色/白色膠囊。

2 適應症

末梢性神經障害。

3 用法及用量

3.1 用法用量

通常一日3回，每回使用1顆，可依症狀需要增減之。

4 禁忌

已知對維生素B12或本藥品所含之賦形劑發生嚴重過敏者。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1.本藥品含有鈷，若已知本身對鈷過敏，請告知醫療人員。

5.1.2.曾有鈷過敏病人使用本藥品後發生過敏性接觸皮膚炎之情形。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1.偶有發疹等過敏現象。

8.1.2.間有食慾不振、噁心、下痢等症狀。

8.1.3.皮膚及皮下組織異常:上市後曾接獲使用本藥品後出現皮膚疹、搔癢、痤瘡樣皮疹、血管性水腫、皮膚炎、多型性紅斑等不良反應。

8.1.4.免疫系統的異常:上市後曾接獲使用本藥品後出現嚴重過敏反應或過敏性休克不良反應。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Mecobalamin是一種活化性的甲基型B12，它與傳統的維他命B12製劑如OH-B12(hydroxocobalamin)、CN-B12 (cyanocobalamin)或輔酵素型B12(CO-B12)截然不同，mecobalamin的生體可用率(bioavailability)最高，人體血液及腦脊髓液中所含的B12幾乎都是甲基型B12，因只有甲基型B12才能為人體神經細胞直接利用，其他型態的B12不但吸收困難且須經肝臟之酵素經多種轉化成甲基型B12才可被利用，mecobalamin由於具有特殊-CH₃功能基，所以能夠有效的參與神經細胞內甲基的轉化，促進核酸DNA之再生及蛋白質和脂質的生化合成，修補萎縮斷裂的神經元，神經軸索或神經髓鞘，因此mecobalamin是末梢神經病變之最佳藥物選擇。

10.1.1.改善神經組織中，核酸及蛋白質代謝方面的障害:所有各種型態的B12，只有mecobalamin這一型才能參與甲基的移轉反應。在RNA轉化過程中促成甲基化，對蛋白質的合成很重要，能促使methionine的合成。Mecobalamin能使鼠體在缺乏B12及folic acid的狀況下提高其吸收uridine的能力，且助於神經細胞恢復DNA的正常含量，有助於神經組織進行核酸及蛋白質的合成。

10.1.2.體內藥物動態:通常於健康成人經口服與每日1.5mg連續投與7日，同時血中維他命B12的濃度徐徐增加，平均於投與80小時後濃度達到最高，其值為2.53mg/mL。

10.1.3.臨床方面效果:末梢神經障害患者進行臨床雙盲試驗，結果發現mecobalamin對44%(134/305)的病人有療效。(就針對口服療效而言)。

10.1.4.神經組織修護作用:以鼠體為實驗的各項實驗中，已經證明mecobalamin能修護單面受壓挫的坐骨神經，促使萎縮的肌肉恢復，此種機轉是在受挫神經患部刺激Schwann細胞，促進脊髓的生成，蛋白質的生成。對兔體進行過敏性腦炎(或神經炎)實驗時，發現mecobalamin能抑制患部組織功能退化及惡化，在神經組織患部表現其療效。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

114.08.06

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

6~1000粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

25°C以下儲存。

製造廠

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路 2 7 2 號

藥商

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗三路272號