



可治菌錠

CO-TRIZOL TABLETS "Y.C."

衛署藥製字 第 033163 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-11-29

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each Tablet contains:

Trimethoprim 80mg

Sulfamethoxazole 400mg

1.2 賦形劑

Povidone K-90、Silicon dioxide hydrated、Magnesium stearate、Sodium starch glycolate (Primogel)、Croscarmellose sodium。

1.3 劑型

錠劑

1.4 藥品外觀

白色圓形素錠，反面有一分割線。

2 適應症

由革蘭氏陽性菌及陰性菌所引起之呼吸道、胃腸道、尿道感染症。

3 用法及用量

3.1 用法用量

-成人:通常一次2錠，一天兩次，嚴重感染時，開始劑量可增為4錠，敗血病(Septicaemia)症狀時一天可增為三次。

-小孩:6~12歲通常一次1錠，一天兩次，6歲以下酌減。

4 禁忌

本劑不適於孕婦或對於磺胺類有過敏的病人。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 嚴重皮膚不良反應(SCARs)上市後曾有嚴重皮膚過敏反應如史蒂文生氏強生症候群(Stevens-Johnson syndrome、SJS)、毒性表皮壞死溶解症(Toxic Epidermal Necrolysis、TEN)、急性廣泛性發疹性膿疱症(Acute Generalized Exanthematous Pustulosis、AGEP)和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增高及全身症狀症候群(Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms、DRESS)的案例被通報，其中包括致命的案例。如果出現嚴重皮膚不良反應相關症狀或癥候，應立即停藥並給予適當臨床處

置。

5.1.2 服用磺胺藥因而引起滲出性多形紅斑 (erythema multiforme exudativum)導 致死亡及發生嚴重血液惡質(serious blood dyscrasia)包括再生障礙貧血 (aplastic anemia)、顆粒性白血球缺乏 病(agranulocytosis)、血小板減少症 (thrombocytopenia)、全部血球減少症 (pancytopenia)等症狀，如在治療時發疹，應立即停止使用，慢性尿道感染及 慢性支氣管炎與細支氣管擴張等應限制使用。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

本劑不適於孕婦。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 嚴重皮膚不良反應(SCARs)上市後曾有 嚴重皮膚過敏反應，包含「史蒂文生氏 強生症候群 (SJS)、毒性表皮壞死溶解 症(TEN)、急性廣泛性發疹性膿疱症 (AGEP)和藥物反應伴隨嗜伊紅性白血 球增高及全身症狀症候群(DRESS)」的 案例被通報，其中包括致命的案例。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Sulfamethoxazole與PABA競爭而抑制微生物體內葉酸之合成，trimethoprim則能抑制酵素阻礙雙氫葉酸還原為四氫葉酸。

10.2 藥效藥理特性

此二種成分合用，使微生物之葉酸代謝過程中，連續兩個步驟均予阻斷而起相乘之藥效。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

8~1000錠塑膠瓶裝。


13.2 效期

111.11.29

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

儲存於25°C以下。



製造廠

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路 2 7 2 號

藥商

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路 2 7 2 號