

十 全 藥 品

抗過敏劑

“十全” 洩敏膜衣錠 10公絲
Cemine F.C. Tablets 10mg “S.C.”

衛署藥製字第043403號
G-6913號
Code NO.8707

【成分】：Each F.C. tablet contains:
Cetirizine 2HCl.....10mg

【作用機轉】：
(1)Cetirizine是一種抗組織胺劑，也是Hydroxyzine在人體中的代謝產物。它主要的藥理作用是選擇性的抑制周邊血管的H1-receptor。
(2)Cetirizine不具有Anti-cholinergic和Anti-serotonergic的作用。
(3)臨床實驗中顯示，與安慰劑比較下，本品較易出現口乾現象。

(4)Cetirizine對H1-receptor有很高的專一性，且不會通過腦血管障壁，對腦部H1-receptor沒有親和力。

【藥品動力學】：
(1)Cetirizine錠劑口服後可迅速被吸收，其生體可用率與口服液劑相當。
(2)食物不會影響Cetirizine的吸收量，但有食物存在下，Tmax(最大吸收時間)會被延遲1.7小時，而且Cmax(最大吸收濃度)會被減少23%。
(3)Cetirizine大多數被代謝於尿液中，少量被代謝於糞便中，首渡肝臟代謝作用(First pass metabolism)的程度很低，其代謝主要經由O-dealkylation的氧化作用變成無抗組織胺活性的代謝物。

【適應症】：
季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

【用法用量】
本藥須由醫師處方使用。
成人及6歲以上孩童適用。

晚餐時，口服10mg Cetirizine(即一錠)與液體併服。
對副作用敏感之患者，改為早晚各服5mg Cetirizine(即半錠)。

【禁忌症】：
對本藥中任何成分有過敏者。

【副作用】：
(1)曾有報導顯示會發生輕微、短暫的主觀性副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、精神激昂、口乾、胃腸不適。
(2)但由精神運動性(Psychomotor)的客觀性功能試驗結果來看，Cetirizine的鎮靜作用發生率與安慰劑的效果相似。
(3)Cetirizine的過敏性症狀極少被報導。

【注意事項】：
在治療劑量下，Cetirizine不會加重酒精(血中酒精濃度為0.8g/L時)的作用，但應避免。

【孕婦及授乳婦】：
動物實驗上，尚無引起畸型胎之報告，但懷孕(尤其是前3個月)及哺乳的婦女請勿投與。

【藥物交互作用】：
至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用鎮靜劑者，請謹慎使用。

【開車或操作機械】：
實驗證明，對正常人授予20-25mg/天的劑量，不會影響警覺及反應時間，但從事駕駛及操作機械者，請小心使用，儘量不要過量使用。

【過量】：
超過50mg/次使用，會有安眠之症狀發生，無特殊之解毒劑，因此，如有此現象發生，請儘快以灌腸法及一般急救法處理。

【賦形劑】：
Lactose, Corn Starch, Povidone, Magnesium Stearate, Hydroxypropylmethyl Cellulose, Titanium Dioxide, Castor Oil。

【包裝】：2~1000 錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。



十全實業股份有限公司
公 司：南投市南崗工業區仁和路27號
電 話：(049) 2254221~3
服務專線：(049) 2254615
訂購專線：0800-491666
傳 真：(049)2254617



衛署藥製字第043403號
G-6913號
Code NO.8707

十全實業股份有限公司
SHOU CHAN INDUSTRIAL CO.,LTD.
台灣南投市南崗工業區仁和路27號

【成分】
Each F.C. tablet contains:
Cetirizine 2HCL.....10mg

【適應症】
季節性鼻炎、結合膜炎、過敏性鼻炎、
蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象

批 號：
保存期限：

【用法用量】
1.本藥須由醫師處方使用。
2.成人及6歲以上孩童適用，晚餐時，口
服10mg錠劑一錠與液體併服。
3.對副作用敏感之患者，改為早晚各服
5mg(即半錠)。

【注意事項】請詳閱說明書後使用。

4 711914 440351

內有使用說明請由此打開

十全實業股份有限公司
SHOU CHAN INDUSTRIAL CO., LTD.
台灣南投市南崗工業區仁和路27號
電話：049-2254222

