

藥物因藥理作用，會對人類胎兒或新生兒造成或疑似造成有害作用，但未造成畸形。這些作用可能為可逆性。懷孕期間服用 **Tofranil** 的經驗有限。由於沒有使用 **Tofranil** 與胎兒胎兒的潛在風險時，才可考慮使用。**Tofranil** 之藥，只有當治療收益和損可平衡胎兒胎兒的潛在風險時，才可考慮使用。
流行病學研究證實，懷孕期間使用抗憂鬱劑會導致先天性異常風險增加，且懷孕期間使用抗憂鬱劑可能會增加早產發生率。
針對母親服用 **Tofranil** 且至分娩前的觀察，出生後的前幾個月會出現例如呼吸困難、昏睡、絞痛、易驚、低血壓或高血壓、震顫或抽筋等症狀。為了避免發生這類症狀，如果可能應於預計分娩日期前至少 7 週逐步停藥。

於授乳期間使用
少量之 **imipramine** 與 **desmethylinipramine** 會進入母乳中。由於目前並不清楚此結果與嬰兒的臨床相關性，因此其實應斷奶或逐步停藥。

對覺醒及使用機械能力的影響
Tofranil 可能會造成疲勞、視力模糊、嗜睡與其他中樞神經症狀（見第 4.8 節不良作用（不良影響）），而這些可能會影響癱瘓病人的反應。因此必須警告病人，不可進行需具備高度反應性的活動，例如開車與操作機械。並應警告病人酒精或其他藥物可能會強化這些作用（見第 4.5 節與其他藥物的交互作用以及交互作用的其他形式）。

不良作用（不良影響）
不良作用不一定與血藥濃度或劑量有關。若發生嚴重神經或精神反應，應停用 **Tofranil**。老年病人特別容易出現抗膽鹼、神經、精神以及心血管作用。
通報率如下所示：

非常罕見： $\geq 10\%$
罕見： $\geq 1\%$ 且 $< 10\%$
罕見： $\geq 0.1\%$ 且 $< 1\%$
非常罕見： $< 0.01\%$
非常罕見： $< 0.001\%$
非常罕見： $< 0.0001\%$

血液和淋巴系統異常
非常罕見：
免疫系統疾病
非常罕見：
內分泌異常：
非常罕見：
代謝和營養系統異常

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：
非常罕見：

報導、意識狀態、混濁與血清素症候群。
• 心血管：心悸不寧、心煩過速、傳導障礙、低血壓、中風、心臟衰竭；在極罕見案例中曾發生心臟驟停。

• 呼吸系統：呼吸抑制、鼻塞、呼吸困難。
• 其它：可能發生嘔吐、噁心絞痛、便秘、發熱、盜汗和少尿或無尿。

用藥過量會導致 QT 延長、多型性心室心搏過速及死亡等罕見個案。
治療

無專門解毒劑。治療方法主要為症狀與支持性治療。
經口服用藥物時，應投予活性炭。若於攝入藥物後 1 或 2 小時內投予活性炭，可降低藥物吸收。針對非意識完全清醒或有嘔吐反射

癱瘓的病人，應考慮使用藥後導管後給藥以減少吸收能力。
綠的接受過量 **Tofranil** 的病人，尤其是兒童，應由院密切觀察至少 72 小時。三環類藥物嚴重中毒須立刻住院，並持續監測心血管功能至少 48 小時。

若發生用藥過量，應採取以下措施：
• 嚴重低血壓：病人維持血流穩定，並給予血漿扩容劑。
• 必須根據臨床需求治療心臟和心律不整。
• 若發生心跳過速，應考慮使用 β 受體阻斷劑。

• 應維持低體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。

• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。
• 應維持正常體溫，應避免過度發熱。