

“衛達”

克治喘

膠囊 1 毫克

(可多替芬)

Ketibron Capsules 1mg "Weidar"
(Ketotifen)

GMP G-0318

CODE No. KB-0470



許可證字號：衛署藥製字第 028648 號

類別：須由醫師處方使用

1. 性狀

1.1 有效成分及含量：每膠囊含：

Ketotifen fumarate.....1.38mg (Equivalent to ketotifen.....1mg)

1.2 賦形劑：

Potato Starch, Lactose Anhydrous, Sodium Starch Glycolate, Silicon Dioxide
Colloidal, Magnesium Stearate, Capsule Shell(Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate,
Titanium Dioxide, Tartrazine, Brilliant Blue FCF, Printing Ink)

1.3 劑型：膠囊劑

1.4 藥品外觀：黃綠色帽和白色身之 3 號膠囊，印有 KB 0470 黑色字樣

2. 適應症：支氣管氣喘、過敏性鼻炎、濕疹、皮膚炎、蕁麻疹、皮膚瘙癢症。

3. 用法及用量：一次一膠囊，一天 2 次，早飯後和就寢前服用之。

4. 禁忌：曾因本藥成分或賦形劑引起過敏者不得使用。

5. 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.2 操作機械能力：本劑有催眠作用，服用本劑時，駕駛車輛及操作危險性機械時應特別注意。

5.3 其他注意事項：長期使用類固醇患者，投與本劑時，宜慢慢減少類固醇量。

6. 特殊族群注意事項

6.1 懷孕：安全性尚未確立，治療上宜判斷有益性與安全性

6.2 哺乳：由老鼠的動物試驗顯示，本藥可自乳汁中移行，故授乳婦宜避免投與或是必須投與時，則要避免哺乳。

6.3 老年人：對高齡者之投藥須注意減量用藥。

7. 交互作用：若與鎮定劑、催眠劑等中樞神經抑制劑、抗過敏劑、酒精併用，會因交互作用而使本劑藥效增強，因此需減量慎重投與。

8. 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

(1) 過敏症：偶而有發疹等過敏症狀出現之場合時，中止使用。

(2) 精神神經系：嗜眠、口渴、倦怠感、偶而會出現。

(3) 胃腸：偶而有噁心、嘔吐、食慾不振等症狀出現。

(4) 肝臟：偶而出現 GOT、GPT、ALP 上昇之現象。

9. 過量：通過一般藥物清除方法（催吐，洗胃，給予活性炭等）清除該藥物。

此外，根據需要進行對症治療。

10. 藥理特性

10.1 作用機轉

(1) 抑制化學傳達物質之游離(in vitro)：Ketotifen 能抑制過敏反應中，histamine 和 SRS-A 等化學傳達物質之游離。(肥大細胞，嗜鹼性白血球，嗜中性白血球等所釋放)

(2) 抑制化學傳達物質對於支氣管之收縮(in vivo)：Ketotifen 能抑制由於 histamine 和 SRS-A 所誘發之支氣管收縮。

10.2 藥效藥理特性

(1) 抗過敏性作用(Anti-Anaphylaxis)：抑制支氣管氣喘過敏性鼻炎等過敏性反應。

(2) 抗組織胺作用：抑制組織胺所引起之呼吸道收縮，血管透過性亢進，鼻汁分泌亢進，皮膚反應等。

(3) β -受容體(β -receptor)之改善。

(4) 抑制誘發試驗所引起之鼻粘膜反應，對於過敏性鼻炎患者，可抑制因誘發抗原所致之肺機能低下。又可減弱 Histamine 及 Acetylcholine 對呼吸道之過敏性。

(5) 抑制誘發試驗所引起之皮膚反應：對於萎縮患者，可以抑制因誘發抗原或 Histamine 所致之膨疹、紅斑等皮膚反應。

10.3 臨床前安全性資料：目前尚無資訊。

11. 藥物動力學特性：

(1) 吸收：以 3H-Ketotifen 1.9mg 經口投與後，完全由消化管吸收，約 3.3 小時後達血中最高濃度 15.5mg/ml，血漿中半衰期可得短期半衰期 2.9 小時，和長期半衰期 22 小時。

(2) 排泄：經口投與後，大部份在 24 小時內由尿及糞便中排泄，無積蓄性現象發生，由尿中排泄率約 61%。

12. 臨床試驗資料：目前尚無資訊

13. 包裝及儲存

13.1 包裝：4-1000 粒塑膠瓶、鋁箔盒裝。

13.2 效期：3 年

13.3 儲存條件：室溫 25°C 以下貯存。

LT-KB

衛達化學製藥股份有限公司

臺中市南屯區寶山里工業區 23 路 21 號

最後修訂日期：111 年 04 月 26 日