

"華興"去氫錠

PREDSON TABLETS "H.S."

衛署藥製字 第 010139 號

須由醫師處方使用

版本日期 2025-08-19

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每錠含：Prednisolone.....5mg

1.2 賦形劑

Lactose、Starch、Sodium Starch Glycolate、Povidone、Magnesium Stearate、Talc、Tartrazine、Brilliant Blue FCF。

1.3 劑型

一般錠。

1.4 藥品外觀

綠色圓形錠。

2 適應症

支氣管氣喘、過敏性病患、風濕性關節炎、骨關節炎、痛風性關節炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

通常成人一日4~6錠，分4次服用。

4 禁忌

「目前尚無資訊」

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 急慢性感染症使用時，請同時並用適當的化學療法劑或抗生素藥品，以治療感染疾病。

5.1.2 對消化道障礙如胃腸潰瘍患者，務請特別注意。

5.1.3 因主要副作用為引起浮腫、血壓上升、尤以腎臟疾病及高血壓患者應注意。

5.1.4 糖尿病患者使用時請注意增加Insulin之用量。

5.1.5 對於有精神病因素者多加注意。

5.1.6 服用本劑期間，請充分補充蛋白質。

6 特殊族群注意事項

「目前尚無資訊」

7 交互作用

「目前尚無資訊」

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

「目前尚無資訊」

9 過量

「目前尚無資訊」

10 藥理特性

10.1 作用機轉

「目前尚無資訊」

10.2 藥效藥理特性

「目前尚無資訊」

10.3 臨床前安全性資料

「目前尚無資訊」

11 藥物動力學特性

「目前尚無資訊」

12 臨床試驗資料

「目前尚無資訊」

13 包裝及儲存

13.1 包裝

8~1000錠塑膠瓶裝，PTP鋁箔盒裝、2000錠塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

儲存於30°C以下。

14 病人使用須知

本藥屬於醫師處方用藥，患者應在醫師診斷處方後依指示服用。

製造廠

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 1 2 8 號

藥商

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷 1 2 8 號