



十全藥品

衛署藥製字第039407號
G-5061號

“十全”美克寧錠 5公絲(美奎塔令)
Mekin Tablets 5mg "S.C." (Mequitazine)

本劑含有Mequitazine，其化學分子式 $C_{20}H_{22}N_2S=322.5$

【成分】：每錠中含有：
Mequitazine..... 5mg

【作用】：一種 Phenothiazine 系抗組織胺劑，這類藥物在動作器官上（如血管和非血管的平滑肌，唾液腺和呼吸道黏膜腺體）的 H_1 接受體部位，會與組織胺產生競爭性的阻斷作用。同時它具有抗膽鹼激性（如口乾）和鎮靜的作用。

【適應症】：過敏性鼻炎、乾草熱、蕁麻疹、濕疹、血管性神經水腫、季節性結膜炎、藥物過敏。

【用法·用量】：成人一天2錠，早晚各1錠。

【注意事項】：

1. 一般注意：因有催眠作用，投與中之患者在駕駛車輛或操作危險性之機械操作者應特別注意。

2. 禁忌：a. 對於 phenothiazine 系化合物及其他類似化合物過敏者，應禁止使用本劑。
b. 青光眼之患者。
c. 前列腺肥大等下部尿路閉塞性疾患及胃腸阻塞之患者。

3. 慎重投與：腎障害患者。

4. 相互作用：Barbituric acid誘導體、麻醉劑、麻醉性鎮痛劑、鎮靜劑及精神安定劑等中樞神經抑制劑、抗鬱劑、MAO(單胺氧化酶)阻害劑、若與類Atropine作用藥物併用或攝取酒精時，會增強其相互作用，應減量並慎重投與。

5. 副作用：a. 過敏症：偶有發疹，光線過敏症等症狀出現，應停止用藥。
b. 肝臟：很少數有出現GOT、GPT上升之現象。
c. 血液：很少數有出現血小板減少現象，認定異常時，應中止用藥。
d. 精神神經系：偶有嗜睡、倦怠感、頭暈，很少數有頭痛、暈眩等症狀出現。
e. 消化器：偶有口渴、胃部不適，很少數有下痢、便秘、食慾不振、嘔吐、胃痛、腹痛等症狀。
f. 循環器：很少數有胸部苦悶感及心悸亢進的症狀。
g. 泌尿器：很少有排尿困難之症狀。
h. 其他：很少數有咽喉痛、浮腫、臉部潮紅、視調節障礙等症狀。

6. 高齡者投與：臨床試驗中，高齡者的副作用以口渴發生率較高的傾向。

7. 孕婦之投與：關於孕婦投與之安全性尚未確立，故孕婦及有妊娠可能之婦人勿使用。

8. 小兒：對於小兒投與之安全性尚未確立（較少使用經驗）

【賦形劑】：

Lactose, Povidone, Tartrazine Aluminum Lake, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Talc, Powder Cellulose, microcrystalline Cellulose, SUNSET Yellow NO.5 Aluminum Lake, Hydroxypropylmethyl cellulose。

【包裝】：4~1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

【儲存條件】：於25℃以下儲存。

十全實業股份有限公司

公司：南投市南崗工業區仁和路27號 電話：(049) 2254221-3
服務專線：(049) 2254615
訂購專線：0800-491666
傳真：(049) 2254617