



十全藥品

適用藥害救濟制度



衛署藥製字第038454號

胃、十二指腸潰瘍治療劑

“十全”喜佳胃錠 200公絲(希美替定)

Cimetidine Tablets 200mg " S. C. "

【作 用】：

本劑主成分 Cimetidine 係選擇性的組織胺 (Histamine) H₂ 感受器之拮抗劑，其作用為可抑制基礎胃酸分泌及對食物、組織胺、胃泌素 (Gastrin) 咖啡因 (Caffeine) 及胰島素 (Insulin) 之刺激而引起的胃酸分泌抑制達50%以上，使胃中PH值達5以上，而不活化胃蛋白酶，使胃潰瘍或十二指腸潰瘍患者在4~6週內得到迅速而有效的治癒。

本劑亦可與其他制酸劑、鎮靜劑、鎮痛解熱劑、利尿劑、支氣管鬆弛劑、毛地黃等配合併用。可預防及控制急性糜爛性胃炎及消化性潰瘍併發症所引起之出血。

【成 分】：每錠中含有：

Cimetidine..... 200mg

【適應症】：

十二指腸潰瘍、胃潰瘍、食道炎、上胃腸道出血、胃酸過多症。

【用法·用量】：

通常每日3次，用餐時服用，每次1錠，及睡前服用2錠。持續治療則為每天睡前服用2錠，或早上服用1錠，晚上服用1錠，持續治療4~6星期以上，必要時可持續治療6個月，以免除復發，依照症狀輕重酌量增減。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

(1)一般注意：

- ①本劑有弱抗雄性激素作用，但不減少性能力或生育力。
- ②血漿中Testosterone微增，與服用其他制酸劑同。
- ③動物高劑量實驗(人之9~56倍)有Leydig's cell 良性瘤反應。

(2)老年人或重病患者(腎不全或機能腦性綜合病症)，在服用過量下產生精神慌亂現象，停藥48小時即可回復。

(3)相互作用：

- ①服用本劑有抗凝血之現象，因此服用抗凝血劑應調整劑量。
- ②併用本劑及antimetabolites, alkylating agents 或其他引起嗜中性血球減少之藥物可降低白血球數。

(4)妊 婦：本劑可透過胎盤，因此非必要不使用。

(5)授乳婦：可進入乳汁，因此使用本劑後一般不授乳。

(6)小 兒：16歲以下，必要時服用，服用量為一日20~40mg/kg。

(7)副 作 用：

①偶有中度短暫性之下瀉，肌肉痛、眩暈、發疹。

②投與一個月以上偶有gynecomastia 現象。

③稀有白血球減少、血小板減少，再生不良性貧血。

④稀有血漿中Transaminase增加，發熱，間質性腎炎、肝炎、胰炎，停藥後可回復。

【賦形劑】：

Lactose, Corn Starch, Povidone, Peppermint Oil, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate.

【包 裝】：10~1000錠塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。

十全實業股份有限公司

南投市南崗工業區仁和路27號

電話：(049) 2254221-3
服務專線：(049) 2254615
訂購專線：0800-491666
傳 真：(049) 2254617