



十全藥品

衛署藥製字第025716號



止血劑

“十全”血舒敏膠囊

250公絲(妥內散敏)

Tranexamin Capsules 250mg“S.C.”(Tranexamic acid)

當身體受細菌，濾過性病毒等感染，或任何因外界因素的刺激而使細胞受損，或是由抗原的入侵而產生抗原抗體反應，均會引起血液內的血漿質的異常亢進，血漿質會使血液和組織中的纖維蛋白和各種凝血因子破壞而消化之產生各種分解產物（致炎物質）此種現象導至正常機能趨向過敏症狀或炎症症狀，它們還能抑制血小管凝進作用，本劑具有強力的抗血漿質作用即是抑制血漿質的異常活性化，壓抑產生過敏症及炎症的蛋白分解物，使炎症症狀得以迅速消失，同時使血液內司凝固作用的蛋白質發揮正常功能，維持凝血機能，以達止血的效果。

【成 分】：每膠囊含

Tranexamic acid250mg

【作 用】：

1. 抗血漿質作用：生體內或試管內均顯示有抗血漿質作用。
2. 出血抑制作用：阻止纖維素溶解酵素作用，以抑制出血。
3. 抗過敏，抗炎症作用。

【適應症】：

全身及局部出血或出血性疾病。

【用法・用量】：

成人一天 750mg ~ 2000mg，分 3 ~ 4 次服用。孩童一日量一歲以下 75 ~ 200mg，2 ~ 3 歲 150 ~ 350mg，4 ~ 6 歲 250 ~ 650mg，7 ~ 14 歲 400 ~ 1000mg，15 歲 750 ~ 2000mg，分 3 ~ 4 次服用。本劑須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 慎重投與：(1) 腦血栓，心肌梗塞，血栓靜脈炎等之患者。
(2) 腎機能不全之患者。
2. 副作用：(1) 有過敏症狀出現時，應即中止服用。
(2) 偶有食慾不振，噁心、下痢，胸內不適感，血壓降低，皮膚搔癢，發疹等現象。
3. 相互作用：與止血性臟器製劑大量併用時，有血栓形成之傾向時要慎重投與。

【賦形劑】Magnesium Stearate.

【膠囊組成】Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Purified Water, Titanium Dioxide, Tartrazine, Sunset Yellow FCF.

【包 裝】：50, 100, 500, 1000's 瓶裝。

十全實業股份有限公司

公司：南投市南崗工業區仁和路27號

電 話：(049)2254221-3

服務專線：(049)2254615

訂購專線：0800-491666

傳 真：(049)2254617

~~e-mail: sc254221@ms14.hinet.net.tw~~