

衛署藥製字第 039087 號

循血敏持續性膜衣錠 400 公絲 (配妥西菲林)

Trenfylline S.R.F.C.Tablets 400 mg
(Pentoxifylline)

網號：E85

【成分名】Pentoxifylline

【劑型、含量】持續性藥效錠；

成份：Each S.R.F.C.Tablet contains：

Pentoxifylline 400mg

【臨床藥理】Pentoxifylline可促進末梢血液循環，作用複雜且尚未完全明瞭。口服吸收良好。吸收後很快經肝臟代謝(first-pass effect)成多種不同代謝物。主要由尿中排泄。

【適應症】末梢血管循環障礙。

【用法用量】本藥須由醫師處方使用

- 1.通常成人劑量，一天3次，每次400毫克，伴著些液體整粒吞服與食物共服。若病人有出現胃腸或中樞神經的副作用時，則其劑量應降低到每天二次，每次400毫克，如果其副作用仍然持續，則停止服用。
- 2.雖然在治療2~4週後，即會出現療效，但仍須持續治療八週以上。
- 3.有低血壓，血壓不穩的患者或腎功能不良者，須調整個別劑量。

【注意事項】

- 1.腎功能不全之患者，pentoxifylline廓清率降低，可能引起毒性，需減少劑量。
- 2.對pentoxifylline有敏感性的病人不可服用此劑。
- 3.有視網膜出血或急性心肌梗塞及懷孕中的婦女不可服用本劑。
- 4.Pentoxifylline和其它代謝物會排泄於乳汁中。老鼠實驗中有引起腫瘤的可能，應依此藥對母親之重要性審慎評估。

FDA Pregnancy Category (懷孕用藥級數)：C
5.18歲以下兒童安全性尚未建立。

6.禁忌：對 pentoxifylline 或 methylxanthines (如caffeine、theophylline、theobromine)過敏者禁用。

【相互作用】

Pentoxifylline會延長prothrombin time，增加出血機會。因此使用warfarin的病人要時常監測PT。有出血傾向者要定期檢驗血液實驗值（包括血紅素、血比容）。

【副作用】

- 1.一般症狀可能有噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈(碰到這些症狀，須作適量的劑量調整)。
- 2.皮膚潮紅、心跳加快，胸氣塞或低血壓(這些副作用可能是因為高劑量的服用，須將劑量減低，作適量調節)。
- 3.少數副作用例子有搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫(這些副作用作適量的劑量調節即可)。
- 4.本品中毒之症狀與劑量有關，通常出現於服用4~5小時後並持續12小時。症狀有潮紅、低血壓、緊張、興奮、顫抖、痙攣、嗜睡、意識喪失、發燒和激動。

治療：洗胃並使用活性炭。監測心電圖與血壓。除了症狀治療外，維持呼吸與血壓，治療心律不整並控制痙攣。

【保存條件】室溫下保存。

【包裝】6~1000 粒鋁箔盒裝，塑膠瓶裝。

賦形劑：Lactose monohydrate，Methocel K100M，Magnesium stearate，HPMC 6 cps，HPMC 15 cps，Titanium dioxide，Propylene glycol



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路23號 TEL：(02)23124200

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ㊦