

"杏輝" 喜美凝膠 (喜普理諾)

CIVIDOID GEL "SINPHAR" (HEPARINOID)

衛署藥製字 第 023231 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

每gm含：

Heparinoid Natural.....3mg
(Heparin activity 250IU)

1.2 其他成分(賦形劑)

Ethanol、Propylene Glycol、Carbomer、Monoethanolamine、Perfume(Ireine)、
Flavor(Orange)、Water Purified、Sodium Bisulfite.

2 用途(適應症)

鈍物創傷後之血腫，淺層性靜脈炎之局部治療。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡

3.4.5 本藥限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜。

3.4.6 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。

3.4.7 使用後請勿覆蓋，以免增加副作用。

3.4.8 不可將喜美凝膠塗抹於傷口或受傷的皮膚。

3.4.9 如同所有含酒精成分的凝膠一般，投與喜美凝膠之後不可包紮。

3.4.10 假若於電離子導藥療法，喜美凝膠應由陰極導入。

4 用法用量

用法用量	使用療程	
依據患部大小，每天二至三次，一般而言，擦上3至5公分長之藥品及足夠。	使用喜美凝膠應持續至病況緩解為止。	
	鈍物創傷的治療	持續10天以上
	淺層靜脈炎	治療1~2週

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	過敏反應(如：紅、腫、起疹子)

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 持續治療兩週之後病情無法獲得改善，或停藥後再復發。

6 包裝

1000gm以下鋁管、塑膠瓶裝。

7 儲存方式

25°C以下保存。請放置於孩童不易觸及的地方。



製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號、新寮路95號、103號(同一廠區)