



"元宙" 元克隆口內膏 (安西諾隆)

YECOLON ORABASE (TRIAMCINOLONE)

衛署藥製字 第 025504 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-09-26

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gm contains

Triamcinolone acetonide1mg

1.2 賦形劑

Liquid paraffin、Strawberry flavor、White petrolatum、Butylated hydroxytoluene、
Aspartame powder、
Sodium polyacrylate。

1.3 劑型

口內膏

1.4 藥品外觀

白色至淡黃色糊狀質地

2 適應症

齒肉、口腔黏膜，舌頭之發炎或潰瘍、口角炎、齒槽膿漏。

3 用法及用量

3.1 用法用量

通常每日一次，睡前適量塗布患處，如果症狀嚴重時可增至3~4次，但最好於飯後塗之。

4 禁忌

4.1 對有結核病、消化性潰瘍或糖尿病之患者，未經醫師之指示不得使用含 Corticosteroid之製劑。

4.2 本品含阿斯巴甜(Aspartame)賦形劑，苯酮尿症患者(Phenylketonurics)不宜使用。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 急慢性感染症使用時，請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品，以治療感染疾病。

5.1.2 當病人接受外用的Corticosteroid治療時，會降低口腔組織之正常防禦功能，具有高度傳染性之口腔微生物會增多，而不會出現尋常口腔感染之徵兆。

5.1.3 當指示使用本製劑時，只會釋出少量的Corticosteroid，但並不會引起全身效應，除非是長期使用外用的Corticosteroid製劑。

5.1.4 若在7日之內，口腔組織未產生修補作用時，則須進行口腔損害之病因學上之檢查。

5.1.5 每次用量視患部大小而定，只要塗敷足夠，成薄膜覆蓋黏附於傷口或潰瘍處即可，隨即會形成潤滑的保護膜，不易脫落。

5.1.6 服用本劑期間請充分補充蛋白質。

5.1.7 長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作(局部類固醇戒斷反應)。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

孕婦使用安全性尚未確定。早期懷孕之婦女避免使用。

6.2 哺乳

授乳之婦女避免使用。

6.8 其他族群

6.8.1 對消化管障礙如胃腸潰瘍患者，務請特別注意。

6.8.2 腎臟疾患及高血壓患者應注意。

6.8.3 糖尿病患者使用時，請注意增加Insulin之用量。

6.8.4 對於有精神病因素者請多加注意。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 長期使用本品可能導致類似口服Corticosteroid之副作用，例如：浮腫、血壓上升、抑制腎上腺功能、Glucose新陳代謝之改變、蛋白質分解代謝及促進消化性潰瘍。通常當停止服用Hormone時即會消失。

8.1.2 皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅，可能會蔓延超出初始治療區域，灼熱或刺痛感，搔癢，皮膚脫屑，滲膿。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

目前尚無資訊。

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

111.09.26

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

25°C以下儲存。

製造廠

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路 2 7 2 號

藥商

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路 2 7 2 號