

外盒、仿單、標籤粘貼表

產品名稱	“杏輝” 必克多黴乳膏 20 毫克/公克(克康那唑)	申請廠商	杏輝藥品工業股份有限公司
衛生署給證號碼	衛署藥製	字 第	035183 號 G-2930 號



“杏輝”

cGMP 藥品

必克多黴[®] (克康那唑) 乳膏 20毫克/公克 KETOCONAZOLE Cream 20mg/gm “Sinphar” — 抗黴菌劑 — (Antifungal Agents)

特性：

1. 必克多黴乳膏含 Ketoconazole，對於皮膚黴菌感染有效。
2. 必克多黴乳膏具有止癢效果。皮膚往往由於皮膚菌及酵母菌的感染而發癢，擦抹必克多黴乳膏後可以改善。

成分：每gm含：

Ketoconazole.....20mg

賦形劑：

Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Sorbitan monostearate、Polysorbate 60、Sodium bisulfite、EDTA-2Na、Boric acid、Sodium borate、Benzoic acid、Water purified

適應症：

皮膚黴菌和酵母菌所引起的皮膚、頭髮及指甲感染症。

用法用量：

一般黴菌感染如腳氣、股癬、足癬(香港腳)及皮膚的念珠菌感染有效。使用時將藥膏塗在發病的皮膚上，並以手輕輕地推開，早晚各一次。平常應注意衛生保健，以防感染或再感染。一般的治療期間大約如下：

- (1) 汗斑的治療一天一次即可，不可中斷使用直至症狀消失後數日為止。如使用四個星期後症狀沒改善的話，須請教醫生。治療期間2-3星期。
- (2) 酵母菌感染2-3星期。
- (3) 股癬2-4星期。
- (4) 腳氣3-4星期。
- (5) 足癬4-6星期。

禁忌症：

對本藥過敏者不可使用。

注意事項：

1. 本劑不可使用於眼部。
2. 在長期使用局部類固醇製劑治療的部位，若立即塗抹本劑可能引起刺激感。因此建議繼續在晨間使用局部類固醇製劑，而在夜間使用本劑，如此以2至3週的時間逐漸減少類固醇的治療用量。如果是使用強效的類固醇製劑，則取代以較弱的類固醇，以上述相同的時間逐漸停藥。
3. 由於本劑為局部使用，不會經皮膚吸收於體內，故孕婦及授乳婦可以使用。

副作用：

少數患者在塗抹本劑後可能產生刺激及灼熱感。

過量：

過量可能會導致紅疹、水腫及灼熱感，在停藥後可消除，若不慎吞服，無需特別處理。

本藥須由醫師處方使用

衛署藥製字第035183號
G-2930號

儲存：25℃以下保存

包裝：1000公克以下鋁管裝、塑膠罐裝。


cGMP



杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號
84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG-SHAN SHINE, I-LAN, TAIWAN
消費者服務專線：(0800)015151 website：http://www.sinphar.com



99.11.01

