

"紐約"特蒂樂乳膏 0.1% (瑞婷羅)

TRETINOIN CREAM 0.1%

衛署藥製字 第 025237 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-19

懷孕：1.可能懷孕婦女、孕婦使用前請洽醫師診治，因本藥於懷孕期間使用的安全性及有效性尚未確立。

2. 育齡婦女使用期間應採行必要的避孕措施。

3. 因依據動物研究顯示含 retinoids 類口服劑型藥品用於懷孕婦女可能會導致胎兒具有先天性異常之風險，雖依目前臨床文獻資料，若依照仿單建議用法用量，外用劑型 retinoids 類藥品，因經皮吸收量微小，並未有明確證據顯示對於胎兒健康有害，但仍應經過審慎評估後使用。

【藥理作用】本藥主成分Tretinoin屬於維他命A酸類藥品，有研究顯示，塗抹之後能使表皮角質層容易剝離，並能促進表皮細胞分裂活動趨於正常，減少粉刺的形成。

1 成分

1.1 有效成分及含量

Each gram contains:

Tretinoin.....1.0 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Cetylstearyl alcohol、Cetomacrogol、Ethoxydiglycol、Butylated hydroxytoluene、
Dimethicone、Mineral oil、Chlorocresol、Sodium phosphate monobasic dihydrate、
Edetate disodium、White petrolatum、Phosphoric acid、Purified water

2 用途(適應症)

尋常性痤瘡(面皰)丘疹。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 有深部皮膚組織感染。

3.2.2 12歲以下。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 正在使用其他外用痤瘡（青春痘、面皰）治療藥物或併用其他痤瘡輔助治療。

3.4 其他使用上注意事項

- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。
- 3.4.4 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
- 3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- 3.4.6 本藥僅能使用於痤瘡(青春痘、面皰)部位，不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）。
- 3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
- 3.4.8 本藥勿使用於有損傷的皮膚及大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
- 3.4.9 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- 3.4.10 使用前請使用於 1~2個小區域，測試是否會對本藥過敏，若無刺激感發生，再使用本藥。
- 3.4.11 塗抹部位應避免陽光曝曬，並避免與其他皮膚刺激原接觸。
- 3.4.12 皮膚濕疹患者勿用，以免發生嚴重之刺激。
- 3.4.13 避免過度使用肥皂、化妝品、收斂劑等。
- 3.4.14 剛開始使用本藥幾個星期內可能有暫時性情況加劇之現象，可減輕用量，約2-3個星期即可見療效，請繼續使用3-4個月即會有佳效。
- 3.4.15 過量使用並不會加速或提高治療效果，皮膚還可能發生紅斑、脫皮及不適等症狀。

4 用法用量

1天1~2次	使用前先把患部用肥皂把皮膚表面的油脂洗掉，並用清水沖洗乾淨，等乾燥15~20分後再塗抹。
--------	--

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

部位	副作用
皮膚	泛紅、水腫、水疱、痂皮、脫皮及不適等症狀。暫時性過度或過少色素沉著。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。
- 5.2.2 同一部位使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
- 5.2.3 皮膚發生乾燥、脫皮、刺痛、燒灼感時，經降低使用次數或使用低濃度，刺激感未改善。

6 包裝

1000公克以下塑膠罐裝、鋁軟管裝。

7 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

8 儲存條件

請於25°C以下儲存。

製造廠

人人化學製藥股份有限公司中壢廠 桃園市中壢區南園二路 3 號

藥商

人人化學製藥股份有限公司 桃園市中壢區南園二路 3 號