



貝若菲液1毫克/公撮

BENOVATE SOLUTION 1MG/ML

衛署藥製字 第 042798 號

須由醫師處方使用

版本日期 2022-12-28

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each ml Contains :

Betamethasone (17-Valerate)....1mg (1.21mg)

1.2 賦形劑

Propylene Glycol、Ethanol、Purified Water

1.3 劑型

外用液劑

1.4 藥品外觀

無色澄明液體

2 適應症

治療頭皮部嚴重發炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

一天 1 ~ 數次塗抹。

4 禁忌

對本劑過敏者，禁止使用。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 須置於小孩接觸不到之處。

5.1.2 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

5.1.3 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥或就醫。

5.1.4 深部皮膚組織感染請就醫治療。

5.1.5 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇或非類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。

5.1.6 長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作(局部類固醇戒斷反應)。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在

治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

孕婦使用安全性尚未確立，建議避免使用。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 眼瞼皮膚長期使用，會眼壓增加，及引起綠內障。

8.1.2 皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅，可能會蔓延超出初始治療區域，灼熱或刺痛感、搔癢、皮膚脫屑、滲膿。

8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

4000公撮以下塑膠瓶裝。


13.2 效期

如瓶底及外包裝標示。

13.3 儲存條件

111.12.28

25°C以下。



製造廠

美西製藥有限公司

藥商

美西製藥有限公司

高雄市仁武區仁武里工業一路 9 號

高雄市仁武區仁武里工業一路 9 號