



“杏輝”必健乳膏

B-Gencin cream“Sinphar”

衛署藥製字 第 049877 號

本藥須由醫師處方使用

版本日期 2022-10-06

1 性狀

1.1 有效成分及含量

每gm含有：

Betamethasone Dipropionate.....0.64mg

(Equivalent to Betamethasone.....0.5mg)

Gentamicin(as sulfate).....1.0mg(potency)

乳膏每公克含0.64mg betamethasone dipropionate，相當於0.5mg之betamethasone，另含有gentamicin sulfate，相當於1mg gentamicin。

1.2 賦形劑

White Petrolatum、Polysorbate 60、Liquid Petrolatum、Cetyl Stearyl Alcohol、Sorbitan Monostearate、Methylparaben、Propylene Glycol、Sodium Bisulfite、Propylparaben、Edetate Disodium、Water Purified.

1.3 劑型

乳膏劑。

1.4 藥品外觀

白色至微黃色乳膏。

2 適應症

皮膚癬、接觸性皮炎、異位性皮炎、皮膚溢出性皮炎、神經性皮炎、剝落性皮炎、日曬性皮炎。

3 用法及用量

3.1 用法用量

一天兩次(早晚各一次)，薄敷本品至完整覆蓋感染區域。對部份病人而言，適當的維持治療只需較少的塗藥次數即可達到。


4 禁忌

對本製劑中任一成分過敏者禁用。局部類固醇不可用於皮膚接種牛痘、生水痘和結核菌感染之處。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

- 如果產生刺激或過敏，應停止使用。使用全身性類固醇曾被報告的副作用包括：腎上腺抑制，有可能也出現在局部類固醇，尤其是使用於嬰兒或孩童。



- 局部類固醇如果使用面積廣大或採用封閉療法，可能造成全身性吸收增加。在這些情況下需適當注意，或必須長期用藥時應予以注意，尤其是在嬰兒或孩童。
- 局部使用的gentamicin全身性吸收，可能因廣泛的體表面積治療而增加，特別是長時間使用或於皮膚遭到破壞時。在此情況下，可能發生gentamicin全身使用引起的不預期作用，建議於類似狀況下必須小心使用，特別是嬰兒及孩童。
- 局部抗生素的使用有時會造成不具感受性的微生物過度滋長，包括黴菌。如果發生刺激感、敏感或重複感染，應停止gentamicin治療並給予適當處理。
- 本品禁止用於眼睛。
- 長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作（局部類固醇戒斷反應）。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

至今局部類固醇用於孕婦的安全性尚未建立。此類藥物應僅用於懷孕期間證明益處多於對胎兒的危險性，因此孕婦不應廣泛大量使用，或延長治療期。

6.2 哺乳

既然尚未知投與局部類固醇是否會造成充分全身性吸收，而使用泌乳中產生可測得的量，應考量藥物對母親的重要性來決定停止授乳或停用藥物。

6.3 有生育能力的女性與男性

目前尚無資訊。

6.4 小兒

兒童病患可能比成人病患更易受到局部類固醇引起的下視丘腦下垂體、腎上腺軸(HPA)抑制及外生成類固醇作用的影響，此原因為較大體表面積對體重比會增加藥物吸收。HPA軸抑制、Cushing's症、線性生長遲緩、延遲體重增加、及顱內高血壓等皆曾被報導出現於兒童接受局部類固醇。小孩出現腎上腺抑制包括血中皮質醇低下及缺乏對ACTH(親腎上腺皮質激素)刺激反應。而顱內高血壓出現包括囟門腫脹、頭痛及兩側乳頭水腫。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

01. 局部類固醇的不良反應報告包括：灼熱感、搔癢、刺激感、乾燥、毛囊炎、毛髮過盛、面皰發疹、色素不足、口周圍皮膚炎以及過敏性接觸性皮膚炎。密敷包紮下，較常出現的副作用包括：皮膚浸潤、二度感染、皮膚萎縮、橫紋、粟粒疹(痱子)。
02. Gentamicin治療所引起的暫時性刺激(紅腫和搔癢)通常不需因此停止治療。
03. 皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅，可能會蔓延超出初始治療區域，灼

熱或刺痛感，搔癢，皮膚脫屑，滲膿。

9 過量

症狀 - 過量或延長使用局部類固醇可能造成腦下垂體 - 腎上腺功能抑制，導致次發性腎上腺功能不足。並證實產生腎上腺皮質機能亢進，包括Cushing disease。

Gentamicin單次過量使用不至於導致症狀發生。長期過量使用gentamicin可能導致傷口處被黴菌或無感受性菌種過量滋長。

治療 - 應給予適當的症狀治療。急性腎上腺皮質固醇過高的症狀通常是可逆的。如有需要，應治療電解質不平衡。如果是慢性中毒，建議慢慢將類固醇停藥。如發生微生物過度滋長，建議給予適當的抗黴菌或抗菌劑治療。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

本品藥效具有抗發炎、止癢以及血管收縮作用，而作用持續，因此適用一天兩次的給藥方式。

Gentamicin為廣效殺菌性抗生素，可有效治療常見皮膚病原。

對具感受性的菌種包括鏈球菌敏感株(A群beta溶血性及 alpha溶血性)、金黃色葡萄球菌(凝血酶(coagulase)陽性、凝血酶陰性，及部份會產生盤尼西林分解酶(penicillinase)的菌株)，以及格蘭氏陰性菌之綠膿桿菌、好氧桿菌、大腸桿菌、變形桿菌，以及克雷白氏菌。

10.2 藥效藥理特性

含有以上兩種主成分的必健乳膏，適於治療細菌感染之過敏或發炎的皮膚病，如濕疹、皮膚搔癢症及皮膚炎。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

100公克以下鋁管裝、100公克以下、450公克及1000公克塑膠罐裝。

13.2 效期

如包裝所示。

13.3 儲存條件

25°C以下保存。

製造廠

吉輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

111.10.06

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

