



# 適膚乳膏

## CEFUL CREAM "S.C."

衛署藥製字 第 026338 號  
醫師藥師藥劑生指示藥品  
版本日期 2022-08-01

### 1 成分

#### 1.1 有效成分及含量

EACH GM CONTAINS :

MICONAZOLE NITRATE.....20 mg

HYDROCORTISONE.....10 mg

#### 1.2 其他成分(賦形劑)

Cetyl Alcohol、Glyceryl Monostearate、Polyoxyethylene Cetyether、Isopropyl Myristate、Mineral Oil、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Sun-Dia Flower Perfume、Purified Water

### 2 用途(適應症)

治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬（香港腳）、股癬、汗斑、濕疹或皮膚炎。

### 3 使用上注意事項

#### 3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

#### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 深部皮膚組織感染。

3.2.2 三歲以下。

#### 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 65 歲以上。

3.3.2 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.3 正在接受醫師治療。

3.3.4 患部在臉上。

3.3.5 患部化膿。

#### 3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.5 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰）

部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

3.4.6 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.7 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.8 一般黴菌感染療程至少為 2 週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。

3.4.9 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

3.4.10 皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。

3.4.11 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。

3.4.12 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。

3.4.13 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.14 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.15 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。

3.4.16 若在停止使用本藥後數週(通常為兩週內)症狀復發，或症狀已緩解，但皮膚發紅、刺痛、灼熱感，可能為停藥症候群，請持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

#### 4 用法用量

一天 2~3 次適量塗抹於患部，至症狀消失後再繼續用藥數日，防止復發。

#### 5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

| 身體部位 | 副作用                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 皮膚   | <p>1.局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。</p> <p>2.停藥症候群(使用本藥一段時間後，停藥時可能會有發紅、灼熱或刺痛感、劇烈搔癢、脫皮、滲膿等相關副作用，且可能蔓延超出原本治療範圍)。</p> |
| 全身性  | 庫欣式症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。                                                                    |

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 自覺狀況沒有改善或更惡化

5.2.3 經治療後，一般黴菌一星期、股癬和體癬二星期、足癬四星期症狀會改善，若症狀沒有改善，或症狀有改善，但停藥後病情又復發。

6 包裝

1000 公克以下塑膠瓶裝、1000 公克以下鋁軟管裝。

7 儲存方式

25°C以下儲存

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

9 聯絡電話

電話：(049)2254221-3

服務專線：(049)2254615

訂購專線：0800-491666~1

傳真：(049)2254617

製造廠

十全實業股份有限公司

南投縣南投市仁和路 2 7 號

藥商

十全實業股份有限公司

南投縣南投市仁和路 2 7 號