

克您痛凝膠

KENETON GEL

衛署藥製字 第 045357 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-09-16

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gm contains Piroxicam 10mg

1.2 賦形劑

Diethylene glycol monoethyl ether、Butylated hydroxytoluene、Methylparaben、Carbomer、L-Menthol、Triethanolamine、Ethanol、Water purified。

1.3 劑型

外用凝膠劑。

1.4 藥品外觀

透明凝膠。

2 適應症

類風濕性關節炎，骨關節炎(關節痛、退化性關節炎)、僵直性脊椎炎、急性肌肉骨骼損傷和急性痛風、肌肉痛，外傷後之腫脹及疼痛。

3 用法及用量

3.1 用法用量

一天塗擦數次。

4 禁忌

對本劑之成份會產生過敏者禁用本品。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 對於慢性疾患(變形性關節症等)


使用本劑前須先考慮是否用藥物療法以外的療法。患者的狀態須注意觀察，並須留意是否有副作用。

5.1.2 皮膚遭受感染而引起的炎症，

須考慮是否與抗菌劑及抗真菌劑併用，並須觀察及慎重投與。

5.1.3 懷孕30週以上之孕婦使用非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)

可能導致胎兒心臟導管過早閉合和肺動脈高壓，應避免使用。懷孕20週或以上之孕婦使用



非類固醇抗發炎藥(NSAIDs)可能導致胎兒腎臟功能不全(fetal renal dysfunction)、羊水過少(oligohydramnios)，甚至新生兒腎臟損傷(renal impairment)。若醫療專業人員認為病人有必要於孕期20至30週時使用非類固醇抗發炎藥，則應限制以最低有效劑量及最短期間治療。若治療時間超過48小時，醫療專業人員應考慮使用超音波監測羊水狀態。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

6.1.1 對妊娠婦女之安全性尚未建立，本劑不推薦給孕婦使用。

6.1.2 抑制前列腺素合成可能會影響懷孕和/或胚胎/胎兒發育。

部分流行病學研究數據顯示，在懷孕早期使用前列腺素合成酶抑制劑會提高流產、心臟畸形之風險。動物實驗已證實使用前列腺素合成酶抑制劑會導致著床前/後胚胎損失率及胚胎/胎兒致死率增加；此外，曾有動物實驗報告指出，於器官形成期使用前列腺素合成酶抑制劑之動物，其胚胎畸形(包括心血管畸形)之發生率增加。

6.4 小兒

2歲以下兒童之使用須詢問醫師或藥師。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

目前尚無資訊。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

10.1.1 本品為非類固醇抗炎劑，同時具有止痛及消炎作用，不論發炎原因為何，本品均有效。

10.1.2 本品經皮吸收後，據推論可能是經由對發炎媒介物前列腺的合成抑制而產生消炎、止痛的效果。

10.1.3 臨床研究證實本品對外傷或手術等不同原因的疼痛都有效果，止痛效果於塗擦後迅速產生。

10.2 藥效藥理特性

參見10.1.作用機轉。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。


11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

113.09.16

目前尚無資訊。



1000公克以下軟管、塑膠瓶裝。

13.2 效期

參見包裝外標示。

13.3 儲存條件

25°C以下儲存。

製造廠

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路 2 7 2 號

藥商

元宙化學製藥股份有限公司

南投縣南投市南崗工業區南崗三路 2 7 2 號