



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Chronic Lumbar Disc Herniation with Sciatica

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #22

Klinische Details

Arzt: Dr. Alarkany

Datum: 2026-04-28

Beschreibung: Patient presents with persistent radiating pain from the lower back down to the right calf. Diagnosed with L4-L5 disc protrusion. Pain is aggravated by prolonged sitting and forward bending.

Physische Messungen

Größe: 175 cm

Gewicht: 70 kg

Blutgruppe: AB+

Anamnese

Raucher: Ja

Chronische Krankheiten: Ja

Aktivitätsniveau: Mäßig

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient präsentiert sich mit persistierenden ausstrahlenden Schmerzen vom unteren Rücken bis zur rechten Wade, diagnostiziert mit einer L4-L5 Bandscheibenprotrusion. Die Schmerzen werden durch längeres Sitzen und Vorbeugen verstärkt. Die Rehabilitation sollte sich auf die Schmerzlinderung, Verbesserung der Beweglichkeit und Stärkung der Rumpfmuskulatur konzentrieren, um die Belastung der Wirbelsäule zu minimieren und die Funktionalität zu verbessern.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Es wird empfohlen, mit sanften Mobilisationsübungen zu beginnen, die die Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule fördern. Dehnungsübungen für die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Wadenmuskulatur sollten ebenfalls in das Programm aufgenommen werden. Eine schrittweise Steigerung der Aktivität unter Berücksichtigung der Schmerzgrenze ist wichtig.

Vorsichtsmaßnahmen:

Der Patient sollte Aktivitäten vermeiden, die die Schmerzen verschlimmern, insbesondere längeres Sitzen und Vorbeugen. Es ist ratsam, auf schweres Heben und ruckartige Bewegungen zu verzichten. Rauchen sollte ebenfalls reduziert oder eingestellt werden, um die Heilung zu fördern.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die geschätzte Erholungszeit kann zwischen 6 bis 12 Wochen variieren, abhängig von der individuellen Reaktion auf die Therapie und der Einhaltung der Empfehlungen.

Risikobewertung:

Es besteht ein Risiko für chronische Schmerzen und mögliche neurologische Symptome, wenn die Beschwerden nicht adäquat behandelt werden. Eine Überlastung der Wirbelsäule könnte zu weiteren Komplikationen führen.

Warnzeichen:

- Plötzliche Verschlechterung der Schmerzen
- Taubheitsgefühl oder Schwäche in den Beinen
- Verlust der Blasen- oder Darmentleerung
- Fieber oder ungewollter Gewichtsverlust

Testgruppe: Multiple Sclerosis

Test: Knee Flexion (Right)

HÖCHSTER WERT
115.0


NIEDRIGSTER WERT
95.0

DURCHSCHNITT
106.0

GESAMTFORTSCHRITT

Gestiegen um 21.1% ↑



Seit dem ersten Test (2026-04-14)





Datum	Ergebnis	Standard
2026-04-14	95	—
2026-04-18	100	—
2026-04-22	110	—
2026-04-26	110	—
2026-04-28	115	—

Visueller Vergleich: Knee Flexion (Right)

VORHER



NACHHER



Wichtiger Hinweis

Dieser Bericht ist KI-gestützt und dient ausschließlich der informativen Unterstützung. Er stellt keine medizinische Diagnose dar und ersetzt nicht die fachliche klinische Beurteilung. Bitte wenden Sie sich für medizinische Entscheidungen an Ihren Arzt oder Therapeuten.

Erstellt am 2026-08-24 15:26