



Physiotherapie & Rehabilitations-Plattform

Medizinischer Bericht: Post-ACL Reconstruction Rehabilitation

Patienteninformationen

Name: ahmet kalumian

Geburtsdatum: 2025-10-28

Fall-ID: #24

Klinische Details

Arzt: Dr. PSP

Datum: 2026-03-28

Beschreibung: A 28-year-old male athlete, 4 weeks post-op for ACL reconstruction using a hamstring graft. Currently experiencing mild swelling and limited range of motion (ROM) in the right knee.

Physische Messungen

Größe: 182 cm

Gewicht: 78 kg

Blutgruppe: O+

Anamnese

Raucher: Nein

Chronische Krankheiten: Nein

Aktivitätsniveau: Aktiv

Zusätzliche Patienteninformationen

Verletzungsgeschichte: Complete ACL tear occurred during a football match on January 15, 2026, due to a sudden pivoting motion. Surgery was performed on March 1, 2026.

Medikationen: Ibuprofen 400mg as needed for pain, Vitamin D3 supplements, and Omega-3 fish oil.

Funktionsfähigkeit: Partial weight-bearing with one crutch. Knee flexion is currently at 95 degrees. Struggles with stairs and long-distance walking.

Persönliche Ziele: Full return to competitive football within 9 months, restoration of full quad strength, and achieving 135-degree knee flexion.

Intelligente klinische Analyse

Klinische Erklärung:

Der Patient ist ein 28-jähriger männlicher Athlet, der sich vier Wochen nach einer vorderen Kreuzbandrekonstruktion mit einem Hamstring-Transplantat befindet. Aktuell zeigt er eine leichte Schwellung und eine eingeschränkte Beweglichkeit im rechten Knie. Die Rehabilitation zielt darauf ab, die Beweglichkeit und Kraft des Knies wiederherzustellen, um eine vollständige Rückkehr zum Wettkampfsport innerhalb von neun Monaten zu ermöglichen.

Sofortige physiotherapeutische Empfehlungen:

Die physiotherapeutische Behandlung sollte sich auf die Verbesserung der Kniebeugung konzentrieren, einschließlich gezielter Mobilisationsübungen und sanfter Dehnungen. Stärkung der Oberschenkelmuskulatur sollte schrittweise eingeführt werden, um die Stabilität des Knies zu fördern.

Vorsichtsmaßnahmen:

Es sollte darauf geachtet werden, Überlastungen zu vermeiden, insbesondere bei Aktivitäten mit plötzlichen Richtungswechseln oder intensiven Belastungen. Der Patient sollte weiterhin Teilbelastung mit einer Krücke beibehalten und auf schmerzhaftes Bewegen achten.

Geschätzter Erholungsverlauf:

Die vollständige Genesung und Rückkehr zum Wettkampfsport wird innerhalb von neun Monaten nach der Operation erwartet, wobei die ersten sechs Monate auf die Wiederherstellung der Beweglichkeit und Kraft abzielen.

Risikobewertung:

Potenzielle Risiken umfassen eine verzögerte Heilung, anhaltende Schwellungen und mögliche Komplikationen wie eine erneute Verletzung des Kreuzbandes. Eine sorgfältige Überwachung der Fortschritte ist erforderlich.

Warnzeichen:

Notfallzeichen sind anhaltende oder zunehmende Schmerzen, starke Schwellungen, Fieber, Rötung oder Überwärmung des Knies sowie das Gefühl von Instabilität im Gelenk.

Testgruppe: Range of Motion (ROM) Assessment

Test: Knee Flexion (Right)

HÖCHSTER WERT
115.0


NIEDRIGSTER WERT
95.0

DURCHSCHNITT
106.0

GESAMTFORTSCHRITT

Gestiegen By 21.1% ↑

Seit dem ersten Test (2026-04-01)



Datum	Ergebnis
2026-04-01	95
2026-04-05	100
2026-04-10	110
2026-04-20	110
2026-04-26	115

